

Suzbijanje rutave bube *(Tropinota hirta) u voćnjacima*



Na području Jablaničkog okruga tokom faze cvetanja većine voćnih vrsta u 2011. godini utvrđen je jak intenzitet napada rutave bube (*Tropinota hirta*) i to posebno na jabučastom voću – jabuci i krušci. Veliki problem predstavlja njeno suzbijanje jer se ona pojavljuje tokom faze cvetanja kada se insekticidi ne smeju koristiti kako ne bi došlo do trovanja korisnih insekata, naročito pčela.

Najveće štete rutava buba pričinjava u vremenu od 11 časova do 16 časova, ali samo ako je sunčan dan sa umerenim temperaturama i ako nema jakih vetrova. Zbog toga treba primeniti metode masovnog izlovljavanja korišćenjem plavih i belih klopki posebno na uvratinama. Preporučuje se postavljanje posuda bele ili plave boje (mogu biti presečene flaše od mineralne vode i sl.) do 2/3 napunjenih vodom. Najveći broj klopki treba postaviti po obodu parcele, a manji broj u unutrašnjosti zasada. Broj klopki zavisi od intenziteta napada - kod jakog napada treba postaviti i nekoliko stotina po jednom hektaru. Međutim, ova mera je često ograničenog efekta.

Od insekticida za suzbijanje rutave bube mogu se primeniti preparati koji su slabe otrovnosti za pčele **Mavrik 0,3l/ha** ili **Calypso 0,3l/ha**. Primena insekticida se ipak ne preporučuje, pošto je njihov efekat samo trenutani (naleću nove jedinke), a veliki broj korisnih insekata-oprašivača bude ugoržen.