

Zaštita breskve od kovrdžavosti lišća?

Kovrdžavost lišća breskve je jedna od najopasnijih bolesti breskve kod nas. Može naneti vrlo velike štete ako se breskva ne tretira fungicidima blagovremeno, a to je kasno u jesen i rano s proleća. Bolest se razvija na svim zeljastim delovima lišću, mladima, cvetu i plodu.

Ova bolest ne dovodi do direktnog sušenja voćke već do indirektnog slabljenja, dovodi do opadanja lišća i plodova, potom do retrovegetacije – ponovnog listanja, tako da postaje osetljivija na niske temperature i na zaraze od strane dugih parazita. Smanjeno je formiranje cvetnih pupoljaka za narednu godinu ili čak i za duži vremenski period. Prouzrokuje smanjenje prinosa i kvaliteta plodova.

Taphrina deformans ne stvara sekundarne zaraze jer lišće breskve vrlo brzo postaje otporno. Breskva je osetljiva prema zarazi samo u periodu od bubrenja do otvaranja pupoljka. Svo lišće koje se sada pojavljuje, a zaraženo je - klobučavo i deformisano, posledica je ranijih infekcija tokom bubrenja i otvaranja pupoljaka. Sada se lišće breskve ne može inficirati. U ovom periodu primena hemijskih preparata u cilju suzbijanja ovog parazita ne može dati rezultate. U zasadima gde se je kovrdžavost pojavila voćke treba držati u što boljoj kondiciji i primenjivati sledeće mere:

- Obolelo lišće vrlo brzo opada i biva zamenjeno zdravim lišćem u toku juna i jula, ako ne opadne svo lišće poželjno je da se isto što pre ukloni (mehanički) kako bi se intenzivirala vegetacija i voćka se što pre obnovila sa novom, zdravom lisnom masom, kako bi na vreme ušla u period mirovanja i zimskih meseci, a da ne dodje do izmrzavanja

- Voćke treba podjubriti azotnim đubrivima rano u proleće da bi se omogućilo formiranje novog lišća,

- Treba zalivati biljke u toku vegetacije,

- Odstranjivati plodove kako se voćka ne bi previše iznurivala.