



POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513 754 fax: 031/513 491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПСС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЗАСАДА МАЛИНЕ ТОКОМ ЛИСТАЊА

Да би се изданци малине правилно одабрали према квалитету и здравственом стању, било је потребно да се сачека да се пупољци делимично развију. На овај начин се јасно уочавају оболели и лоши изданци који се уклањају, а они са добро развијеним пупољцима се везују за жицу. У великом броју засада није урађена пролећна заштита комбинацијом неког од препарата на бази минералног уља и бакарних средстава.

Заштита током листања је нарочито важна ако није обављено рано пролећно прркање.

За заштиту од болести одабрати неки од препоручених препарата и то:

- FUNGURAN..... 0,30% (0,30 кг/ 100 л воде)
- CUPROXAT..... 0,35% (0,35 кг/ 100 л воде)
- CUPRABLAU Z..... 0,30% (0,30 кг/ 100 л воде)
- CAPTAN..... 0,25% (0,25 кг/ 100 л воде)

Против штетних инсеката у овој фази развоја малине користити неки од понуђених препарата:

- CIPKORD 0,050% (50 мл у 100 л воде)
- TALSTAR 10 EC 0,060% (60 мл у 100 л воде)
- MEGATRIN 2,5 EC 0,030 % (30 мл у 100 л воде)
- ABASTATE 0,10 % (100 мл у 100 л воде)

Препарати Talstar и Abastate, поред инсектицидног имају деловање и на гриње.

PRIMENA HERBICIDA U ZASADIMA MALINE

За сузбијање корова у родним засадима препоручује се примена неког од хербицида:

- CASORON –G25 кг/ха (само у реду, у траке ширине око 0,5 м)
- FUSILADE FORTE.....1,3 л/ха (само за усколисне корове у порасту 10-15 цм)
- GRAMOXONE3-5 кг/ха (корови у порасту 10-15 цм)

Напомена:

- Casoron -G је хербицид који се примењује веома рано, док још коров није изникао или у почетној фази клијања и ницања. За ефикасност овог земљишног хербицида потребна је задовољавајућа влажност земљишта. Препоручује се његова примена само у зони редова.
- Fusilade forte се користи за сузбијање само усколисних корова који су изникли и у порасту 10-15 цм. На малину и на широколисне биљне врсте нема никакво неповољно деловање.
- Грамохоне је контактни хербицид који се примењује за изникле корове пораста 10-15 цм. Мање количине хербицида су поребне ако доминирају широколисни корови, а веће количине су потребне за сузбијање усколисних корова. Хербицид се усваја листом и не креће се кроз биљку корова.

УЖИЦЕ 12.04.2010.