




ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПСС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ

ЗАШТИТУ ЈАБУКЕ И КРУШКЕ

ЈАБУКУ ПРСКАТИ У ФЕНОФАЗИ РАЗВОЈА »РОЗЕ ПУПОЉАК« (као на слици)



КРУШКУ ПРСКАТИ У ФЕНОФАЗИ РАЗВОЈА »БЕЛИ БАЛОНИ« (као на слици)



ЗАШТИТА СЕ ОБАВЉА У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ЧАЂАВЕ КРАСТАВОСТИ (*Venturia sp.*)

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОВОГ ПАРЗИТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ФУНГИЦИДА:

- САРТАН..... у конц. 0,25 % (250 гр у 100 л воде)
- FUNGURAN..... у конц. 0,20 % (200 гр у 100 л воде)
- СУПРОХАТ..... у конц. 0,40 % (400 мл у 100 л воде)
- СУПРАБЛАУ Z у конц. 0,40 % (400 мл у 100 л воде)
- МАНКОГАЛ..... у конц. 0,25 % (250 гр у 100 л воде)
- СНОРУС 75 WG..... у конц. 0,02 % (20 гр у 100 л воде)

2. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ИНСЕКТИЦИДА:

- СРПКОРД у конц. 0,05% (50 мл у 100 л воде)
- МЕГАТРИН..... у конц. 0,02% (20 мл у 100 л воде)
- ДЕЦИС..... у конц. 0,06% (60 гр у 100 л воде)
- ТАЛСТАР..... у конц. 0,06% (60 гр у 100 л воде)

3. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЕПЕЛНИЦЕ ЈАБУКЕ (*Podosphaera leucotricha*)

НАРОЧИТО СУ ОСЕТЉИВЕ СОРТЕ ЈАБУКЕ **АЈДАРЕД, ЈОНАТАН И ГРЕНИ СМИТ**. КОД ОВИХ СОРАТА УСЛЕД РАЗВОЈА ОВОГ ПАРЗИТА МОЖЕ ДОЋИ ДО ПОЈАВЕ МРЕЖАВОСТИ ПЛОДОВА, ШТО ИМ УМАЊУЈЕ ТРЖИШНУ ВРЕДНОСТ.

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПЕПЕЛНИЦЕ У ОВОЈ ФАЗИ РАЗВОЈА ЈАБУКЕ ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ОРГАНСКИХ ФУНГИЦИДА:

- КАРАТАН..... у конц. 0,075% (75 гр у 100 л воде)
- ТОРАС..... у конц. 0,04% (40 мл у 100 л воде)

НАПОМЕНА: - У засадима где је током прошле вегетације било појаве бактериозне пламењаче (*E. amylovora*), препоручује се у овој фази примена бакарних средстава као што су Супрохат или Funguran у горе препорученим концентрацијама.

Током цветања, ако услови за бактеријску пламењачу буду повољни може се применити Супрохат или Funguran у концентрацији 0,05 %. Могуће је мешање наведених препарата са локалсистемчним фунгицидима као што су Chorus или Stroby. Третирање обавити почетком цветања и у пуном цветању.