



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ УСЕВА КРОМПИРА У ТРЕЋОЈ ДЕКАДИ ЈУЛА

ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЛАМЕЊАЧЕ КРОМПИРА (*Ph. infestans*)

После дужег периода без падавина, праћеног високом дневном температуром, остварени су услови за развој и ширење пламењаче кромпира. Препорука фунгицида је прилагођена истовременом сузбијању узрочника пламењаче (*Ph. infestans*) и црне пегавости (*Alternaria sp.*), које се већ јављају на терену. Прскање се може извршити са једним од препоручених препарата:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - RIDOMIL GOLD MZ 68 WP | у дози 2,5 кг/ха |
| - FUZIJA | у дози 2,5 л/ха |
| - CURZATE M WG (или CURZATE R WG) | у дози 3,0 кг/ха |
| - EQUATION PRO WG | у дози 0,4 кг/ха |
| - CONSENTO | у дози 1,8-2,0 кг/ха |
| - REVUS 250 SC | у дози 0,5-0,6 л/ха |
| - CUPROXAT | у дози 2,0 л/ха |
| - FUNGURAN | у дози 2,0 кг/ха |
| - CUPROZIN 35WP | у дози 2,75 кг/ха |
| - ANTRACOL | у дози 1,8-2,0 кг/ха |
| - DAKOFLO | у дози 3,0 л/ха |
| - MANKOGAL-80 | у дози 2,5 кг/ха |
| - DITHANE M- 70 | у дози 2,5-3,0 кг/ха |

У случају да дође до појаве пламењаче у усеву, потребно је хитно извршити заштиту са неким од системичних фунгицида (Consento, Ridomil gold, Equation pro, Curzate ili Fuzija). Прскање поновити са истим средством после пет дана.

2. КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ (*L. decemlineata*)

Ако у овом периоду још увек постоји потреба за сузбијањем кромпирове златице, за ову намену се може користити неко од препоручених средстава:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - MOSPILAN (ili TONUS ili AFINEX) | у дози 250 гр/ха |
| - ACTARA | у дози 70 гр/ха |
| - CONFIDOR 200 SL | у дози 300 мл/ха |
| - CALYPSO 480 SC | у дози 100 мл/ха |
| - CORAGEN | у дози 50-60 мл/ха |

НАПОМЕНА: У случају временских непогода праћених градом и оштећењима биљака кромпира, препоручује се што хитнија заштита таквих биљака коришћењем превасходно неког од бакарних средстава у комбинацији са системичним (Ridomil, Curzate, Fuzija i sl.) јер је оштећена биљка много подложнија нападу пламењаче.

УЖИЦЕ 23.07.2012.