



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЈАБУКЕ И КРУШКЕ У ТРЕЋОЈ ДЕКАДИ ЈУЛА

Суво и топло верме у претходном периоду су погодовали развоју црвене воћне гриње и других штетних гриња у воћарству. Повремене падавине и влажење лишћа и плодова у оваквим приликама обезбеђују повољне услове за ширење гљивичних обољења. Нарочито је велики ризик од ширења чађаве краставости на плодове и од инфекције узрочницима трулежи плодова јабуке и крушке.

ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ЧАЂАВЕ КРАСТАВОСТИ (*Venturia inequalis*, *V. pirina*)

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОВОГ ПАРАЗИТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ФУНГИЦИДА:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| - ANTRACOL | u konc. 0,20% (200 gr na 100 l vode) |
| - DITHANE | u konc. 0,30% (300 gr na 100 l vode) |
| - MANKOGAL 80 | u konc. 0,25% (250 gr na 100 l vode) |
| - DELAN | u konc. 0,035% (350 gr na 100 l vode) |
| - ACORD | u konc. 0,03% (30 ml na 100 l vode) |
| - SCORE | u konc. 0,02% (20 ml na 100 l vode) |
| - SYSTANE 12 E | u konc. 0,035% (35 ml na 100 l vode) |
| - FOLICUR EM 50 WP | u konc. 0,075% (75 gr na 100 l vode) |
| - TERCEL | u konc. 0,20% (200 gr na 100 l vode) |

2. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ИНСЕКТИЦИДА:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| - MOSPILAN (ili TONUS ili AFINEX) | u konc. 0,025% (25 gr na 100 l vode) |
| - TALSTAR (ili FOBOS) | u konc. 0,06% (60 gr na 100 l vode) |
| - CORAGEN 20 SC | u konc. 0,02% (20 ml na 100 l vode) |
| - CIPKORD | u konc. 0,03% (30 ml na 100 l vode) |
| - KONZUL (ili NURELL –D) | u konc. 0,10% (100 ml na 100 l vode) |

Због ефикаснијег сузбијања штетних инсеката и правилног коришћења инсектицида потребно је користити неко друго препоручено средство у односу на претходно коришћено. Применом препарата Talstar постиже се и споредно деловање на гриње паучинаре.

3. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ГРИЊА (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus* sp.) НА ЈАБУЦИ И КРУШЦИ ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ АКАРИЦИДА:

- | | |
|----------------------------|--|
| - NISSORUN | u konc. 0,05% (50 ml na 100 l vode) |
| - DEMITAN | u konc. 0,06% (60 ml na 100 l vode) |
| - ENVIDOR + Mineralno ulje | u konc. 0,060% + 0,25% (60 ml+ 250 ml na 100 l vode) |

НАПОМЕНА: У случају временских непогода праћених градом и оштећењима биљака, потребно је што пре поновити прскање, без обзира на време извођења претходног третирања.