



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ

РЕЗИДБУ И ЗАШТИТУ У ЗАСАДУ МАЛИНЕ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНЕ БЕРБЕ

Од правилног развоја и неге овогодишњих изданака малине зависи у многоме њихово здравствено стање и род у наредној години. Због тога је неопходно да се након обављене бербе у засадима малине изврши сечење и уклањање старих изданака.

Резидбу обавити што је могуће ниже до земље, затим оставити те изданке да се лагано свену и сасуше (3-5 дана), што је потребно да би се млади изданци адаптирали на јаче осунчавање, а затим их резидбом изнад прве, па изнад друге жице лагано уклонити, да се не оштете нови изданци.

По дужном метру шпалира одабрати око 10 здравих и добро формираних изданака. Остале младе изданке, а нарочито оне оболеле или оштећене орезати до основе и уклонити, водећи рачуна о равномерном склопу изданака. Уклоњене изданке треба запалити, да не би служили као извор заразе.

За заштиту од болести треба користити једно од следећих средстава:

QUADRIS (ili QUEEN ili PROMESA)	0,075 % (75 ml/100 l vode)
AKORD	0,075 % (75 ml/100 l vode)
CAPTAN	0,25 % (250 g/100 l vode)
MANKOGAL	0,25 % (250 g/100 l vode)
FUNGURAN	0,20 % (200 g/100 l vode)
CUPROXAT	0,30 % (300 ml/100 l vode)

За сузбијање штетних инсеката може се користити :

TALSTAR 10 EC (ili FOBOS)	0,06 % (60 ml/100 l vode)
NURELL D (ili KONZUL)	0,10 % (100 ml/100 l vode)
MEGATRIN 2,5EC	0,05 % (50 ml/100 l vode)
MOSPILAN (ili TONUS ili AFINEX)	0,025 % (25 g/100 l vode)

Током ове године временске прилике су веома повољне за развој и размножавање гриња. Услед напада гриња може доћи до заостајања у порасту и бочног гранања код младих изданака. За сузбијање гриња у овом периоду могу се применити неки од следећих акарицида:

NISSORUN	0,05 % (50 ml /100 l vode)
ENVIDOR	0,04-0,06 % (40 ml /100 l vode)
SANMITE 20 WP	0,06 % (60 g /100 l vode)
ABASTATE	0,075 % (75 ml /100 l vode)
DEMITAN	0,06 % (60 g /100 l vode)

Заштиту обавити одмах по завршеној берби плодова и обављеној резидби. Земљиште око младих изданака треба одржавати без корова обрадом земљишта, косидбом или применом хербицида као што је Galop или Agram (3-5 l/ha). Код примене ових хербицида корови треба да буду пораста 15-20 цм.

Ове препоручене мере је неопходно извести, јер се са негом и заштитом малине за следећу годину почиње по завршеној берби ове године.