



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ УПОТРЕБУ ХЕРБИЦИДА У КУКУРУЗУ И КРОМПИРУ ПОСЛЕ НИЦАЊА УСЕВА

I СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КУКУРУЗУ

-Од трећег до петог листа (корективно третирање)



1. MONOSAN HERBI.....1,5-2,5 l/ha (корови у фази до 6 развијених листова)

2. MUSTANG.....0,6 l/ha (корови у фази до 6 развијених листова)

3. SIRAN 40SC+ agroDIMARK.....1,25 l/ha+0,5l/ha, (корови у фази од 2-6 листова)

4. GRID 75-WG+BANVEL.....20g/ha+0,5 l/ha (једногодишњи и вишегодишњи широколисни и усколисни корови)

-Кукуруз до 6 листа кукуруза

5. MOTIVELL+CAMBIO.....1 l/ha+2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)

6. TAROT PLUS..... 0,3 kg/ha (усколисни корови 3-5 листова, а широколисни 2-6 листова)

7. TANGENTA+ TALISMAN.....1l/ha+1 l/ha (после ницања усева, када су корови у фази од 2-6 листова, а дивљи сирак висине 15-20 цм)

-Кукуруз у фази осмог до десетог листа

8. LAUDIS + EQUIP1,5l/ha+2,0 l/ha кукуруз у фази од 2-8 листова, широколисни и травни корови

9. CALLISTO (Skaut, Chief).....0,25 l/ha после сетве, а пре ницања или 0,20 l/ha после ницања кукуруза, а најкасније до појаве осмог листа.

10. FOCUS ULTRA *.....1,5-4 l/ha(травне корове) примењује се искључиво у ULTRA* хибридима кукуруза који су толерантни на овај хербицид (NS444 и NS640-ultra; ZP360 и ZP 684 ultra) 1,5-2l/ha дивљи сирак из ризома, 3-4l/ha пиревина, зубача

II СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КРОМПИРУ-после ницања

Широколисни корови

1. SENCOR(VELTON WG)..... 0,50-0,75 kg/ha после ницања

2. BASAGRAN(ili GALBENON, BENTAMARK).....2-3 l/ha сузбијање широколисних корова у фази интензивног пораста

Усколисни (травни) корови

3. FUSILADE FORTE...0,8-1,3 l/ha (травни корови у фази интензивног пораста до 15cm)

4. FOCUS ULTRA.....2-4 l/ha (травни корови у фази интензивног пораста до 15cm)

Пре примене препоручених средстава, прочитати упутство за употребу, које иде уз препарат (додати оквашивач ако је препоручено). После употребе хербицида, потребно је прскалицу добро опрати пре њеног коришћења за друге намене.

УЖИЦЕ 25.04.2014.