



ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ

УПОТРЕБУ ХЕБИЦИДА У РАТАРСТВУ

I СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У СТРИМ ЖИТИМА

-У фази од бокорења до другог коленца

1. **MONOSAN HERBI 500**.....1,5-2,0 l/kg-за сва стрна жита озима и јара од почетка бокорења до првог коленца, изузев овса
2. **LENTEMUL D**.....0,75 -1 l/ha-за сва стрна жита озима и јара, изузев овса
3. **MUSTANG**.....0,4-0,6 l/ha-може се примењивати у свим озимим и јарим житима (изузев овса)
4. **CERALIS (MURAL)** 20 g/ha + **STARANE** 0,4 l/ha или **Bonaca, Lodin**, добро сузбијање Galium
5. **PALLAS**.....0,25kg/ha-за пшеницу, раж, тритикал (не у јечму), сузбијање травних корова (дивљег овса) и широколисних корова



-У фази од трећег листа до појаве заставичара

6. **METMARK** или **TEZIS**.....10 g/ha + **STARANE** 0,4 l/ha или **Bonaca, Lodin**
7. **BONACA EC** iii **LODIN**..... 0,6-1,2 л/ха-у озимим и 0,4-0,8 л/ха у јарим житима, добро сузбија Galium sp.
8. **SECATOR OD**.....0,15 kg/ha -(озима и јара жита), добро сузбија Galium sp.

II СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КУКУРУЗУ

-После сетве, пре ницања

1. **ACETOMARK + TERBIS**.....2,0+2,0 l/ha -потебно да буде кише 5-7 дана након примене (Уместо препарата Acetomark могу се користити: **Acetogal, Acetogal plus, Genius, Guardian**, а уместо препарата Terbis може се користити **Rezon**)
2. **GARDOPRIM PLUS GOLD**.....4,0-4,5 l/ha -после сетве, а пре ницања
3. **DUAL GOLD 960EC + AFALON TEČNI**.....1,3+2,0 l/ha- после сетве, а пре ницања (ако је подусев пасуљ). (Уместо препарата **Dual gold 960EC** могу се користити: **Mont, Basar**, а уместо препарата **Afalon tečni** могу се користити **Galolin mono, Linar ...**)



-До трећег листа кукуруз

4. **MERLIN FLEXX**.....0,40 l/ha- после сетве, а пре ницања или најкасније до трећег листа кукуруза, а корови до четвртог листа. Погодан је у условима сувог пролећа
5. **LUMAX**.....3-3,5 l/ha Примена у парцелама које нису закоровљене вишегодишњим коровима: паламида, попонац (до 2 листа кукуруза)

III СУЗБИЈАЊЕ КОРОВА У КРОМПИРУ

1. **SENCOR**.....1kg/ha-после сетве, а пре ницања(хумусна земљишта 3-5 %);0,75 kg/ha(хумус мањи од 3 %) или после ницања кромпира 0,5 kg/ha
2. **FRONTIER SUPER+STOMP**.....0,8+3,0 l/ha- после сетве, а пре ницања
3. **ZANAT+GALOLIN MONO**..... 4+ 2 l/ha- после сетве, а пре ницања
4. **RACER 25-EC+ AFALON**.....3,0+1,0 l/ha- после сетве, а пре ницања
5. **ARCADE 880EC**.....5 l/ha- после сетве, а пре ницања (делује и на травне корове)

Пре примене препоручених средстава, прочитати упутство за употребу, које иде уз препарат (додати оквашивач ако је препоручено). После употребе хербицида, потребно је прскалицу добро опрати пре њеног коришћења за друге намене.

