



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO


31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЈАБУКЕ И КРУШКЕ

ЈАБУКУ ПРСКАТИ У ФЕНОФАЗИ РАЗВОЈА »РОЗЕ ПУПОЉАК« (као на слици)



КРУШКУ ПРСКАТИ У ФЕНОФАЗИ РАЗВОЈА »БЕЛИ БАЛОНИ« (као на слици)



ЗАШТИТА СЕ ОБАВЉА У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ЧАЂАВЕ КРАСТАВОСТИ (*Venturia sp.*)

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОВОГ ПАРЗИТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ
ФУНГИЦИДА:

- САРТАН или МЕТОД..... у конц. 0,35 % (300 гр у 100 л воде)
- FUNGURAN..... у конц. 0,20 % (200 гр у 100 л воде)
- СУПРОХАТ..... у конц. 0,30 % (300 мл у 100 л воде)
- СУПРАБЛАУ Z у конц. 0,30 % (300 мл у 100 л воде)
- НОРДОХ у конц. 0,20 % (200 гр у 100 л воде)
- МАНКОГАЛ или ДИТХАНЕ..... у конц. 0,25 % (250 гр у 100 л воде)
- СНОРУС 75 WG..... у конц. 0,02 % (20 гр у 100 л воде)

2. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД
СЛЕДЕЋИХ ИНСЕКТИЦИДА:

- СРКОРД или СУТРИН..... у конц. 0,05% (50 мл у 100 л воде)
- ТАЛСТАР или ФОБОС..... у конц. 0,06% (60 мл у 100 л воде)
- КАРАТЕ ЗЕОН..... у конц. 0,025% (25 мл у 100 л воде)

3. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЕПЕЛНИЦЕ ЈАБУКЕ (*Podosphaera leucotricha*)

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПЕПЕЛНИЦЕ У ОВОЈ ФАЗИ РАЗВОЈА ЈАБУКЕ ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ
ФУНГИЦИДА:

- СЕКВЕНСА у конц. 0,013% (13 мл у 100 л воде)
- ТОПАС..... у конц. 0,04% (40 мл у 100 л воде)
- КАРАТХАНЕ ГОЛД..... у конц. 0,05% (50 мл у 100 л воде)

НАРОЧИТО СУ ОСЕТЉИВЕ СОРТЕ ЈАБУКЕ **АЈДАРЕД** И **ГРЕНИ СМИТ**. КОД ОВИХ СОРАТА УСЛЕД РАЗВОЈА
ОВОГ ПАРАЗИТА МОЖЕ ДОЋИ ДО ПОЈАВЕ МРЕЖАВОСТИ ПЛОДОВА, ШТО ИМ УМАЊУЈЕ ТРЖИШНУ
ВРЕДНОСТ.

НАПОМЕНА: - У засадима где је током прошле вегетације било појаве бактериозне пламењаче (*E. amylovora*), препоручује се у овој фази примена бакарних средстава као што су Супрохат или Funguran у горе препорученим концентрацијама.

Током цветања, ако услови за бактеријску пламењачу буду повољни може се применити Супрохат или Funguran у концентрацији 0,05 %. Могуће је мешање наведених препарата са локалсистемчним фунгицидима као што су Chorus или Strobry. Третирање обавити почетком цветања и у пуном цветању.

УЖИЦЕ 13.04.2015.