



ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ УПОТРЕБУ ХЕБИЦИДА У КУКУРУЗУ

-После сетве, пре ницања

1. **ACETOMARK + TERBIS**.....2,0+2,0 l/ha -потребно да буде кише 5-7 дана након примене (Уместо препарата Acetomark могу се користити: **Acetogal, Acetogal plus**, а уместо препарата Terbis може се користити **Rezon**)

2. **DUAL GOLD 960EC (Mont, Basar)+ REZON(Terbis)**.....1,5+2 l/ha-после сетве, а пре ницања

3. **GARDOPRIM PLUS GOLD**.....4,0-4,5 l/ha -после сетве, а пре ницања

4. **DUAL GOLD 960EC(Mont, Basar) + AFALON(Linar, Galolin mono)**.....1,3+2,0 l/ha- после сетве, а пре ницања (ако је подусев пасуљ)



-До трећег листа кукуруз

1. **TERBIS + MUSTANG**.....1+0,6 l/ha- после сетве, а пре ницања или најкасније до трећег листа кукуруза

2. **MERLIN FLEXX**.....0,40 l/ha- после сетве, а пре ницања или најкасније до трећег листа кукуруза, а корови до четвртог листа. Погодан је у условима сувог пролећа

3. **LUMAX**.....3-3,5 l/ha примена у парцелама које нису закоровљене вишегодишњим коровима: паламида, попонац (до 2 листа кукуруза)

-Од трећег до петог листа (корективно третирање)

1. **MONOSAN HERBI**.....1,5-2,5 l/ha (корови у фази до 6 развијених листова)

2. **MUSTANG**.....0,6 l/ha (корови у фази до 6 развијених листова)

3. **MOTIVELL 4 SC+CAMBIO**.....1 l/ha+2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)

4. **GRID 75-WG+BANVEL**.....20g/ha+0,5 l/ha (једногодишњи и вишегодишњи широколисни и усколисни корови)

-Кукуруз до 6 листа кукуруза

1. **MOTIVELL 4 SC**.....1,2 l/ha (корови у фази од 2-6 листова)

2. **TAROT PLUS**.....0,3 kg/ha (усколисни корови 3-5 листова, а широколисни 2-6 листова)

3. **TANGENTA+ TALISMAN**.....1+1 l/ha (после ницања усева, када су корови у фази од 2-6 листова, а дивљи сирак висине 15-20 цм

4. **TALISMAN EXTRA**.....1,25-1,5 l/ha (кад усев има 2-7 листова)

-Кукуруз у фази осмог до десетог листа

1. **LAUDIS**1,5- 2,0 l/ha кукуруз у фази од 2-10 листова, широколисни у фази 4-6 листова

2. **EQUIP**.....2-2,5 l/ha ,кукуруз у фази од 2-8 листова, када су травни корови 1-5 листова

3. **CALLISTO**.....0,25 l/ha после сетве а пре ницања или 0,20 l/ha после ницања кукуруза, а најкасније до појаве осмог листа.

4. **FOCUS ULTRA ***.....1,5-4 l/ha(травне корове) примењује се искључиво у **ULTRA*** хибридима кукуруза који су толерантни на овај хербицид (**NS444-ultra** и **NS640-ultra**; **ZP360-ultra** и **ZP 684 ultra**) 1,5-2l/ha дивљи сирак из ризома, 3-4l/ha пиревина, зубача

УЖИЦЕ 28.04.2015.

Sredstva za zaštitu na bazi iste aktivne materije:

Acetomark, Acetohlor 900

Terbis, Rezon, Hemazin SC-500

Dual gold 960EC, Basar, Mont

Monosan herbi, Monosan herbi 500, Moto ekstra 850, Maton, Lentemul

Cambio, Avalon

Motivell 4 SC, Motivell 6 OD, Talisman, Kelvin, Siran, Innovate, Hemonik, Torpedo, Victus OD

Banvel 480, agro Dimark, Plamen

Tangenta

Callisto, Chief, Mezatrion