



## POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126  
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

### ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЗАСАДА МАЛИНЕ ДО 10 ДАНА ОД ПОЧЕТКА ЦВЕТАЊА

Цветање у засадима малине је ове године почело раније у просеку од 15 до 20 дана него претходне. Ова заштита се примењује од почетка цветања малине да би се заштитили цветови од узрочника сиве трулежи плодова (*Botrytis cinerea*). Паразит остварује заразу преко цветних делова, а касније са развојем и сазревањем плодова изазива њихово труљење. У наредном периоду се очекује пад температуре и честе и обилне кишне падавине, које се смењују са сунчаним интервалима. Овакви услови веома погодују развоју овог паразита. Препоручује се извођење заштите коришћењем неког од следећих фунгицида:

- |                  |                        |                       |     |
|------------------|------------------------|-----------------------|-----|
| - SWITCH         | у концентрацији 0,08%  | (80gr у 100 l воде)   | или |
| - TELDOR         | у концентрацији 0,15 % | (150 gr у 100 l воде) | или |
| - SIGNUM         | у концентрацији 0,15 % | (150 gr у 100 l воде) | или |
| - DIONAL         | у концентрацији 0,20 % | (200 gr у 100 l воде) | или |
| - LINUS          | у концентрацији 0,15 % | (150 gr у 100 l воде) | или |
| - LUNA SENSATION | у концентрацији 0,08%  | (80gr у 100 l воде)   |     |

Нека од ових средстава имају искључиву намену за спречавање појаве трулежи плодова малине (Switch, Teldor i Dional).

Временски услови утичу на интензиван пораст и развој родних гранчица и лисне масе. Све то ствара оптималне услове и за болести као што су *Didymella appianata* i *Leptosphaeria coniothyrium*. Због тога се једном од наведених средстава може додати:

- **QUADRIS** или **PROMESA** или **QUEEN** у концентрацији 0,075% (75 ml у 100 l воде)

**SIGNUM**, **LINUS** и **LUNA SENSATION** делује истовремено и на сиву трулеж и на дидимелу, па се могу применити самостално.

Пре прскања потребно је прскалицу опрати детергентом и водом, добро је испрати, да се одстрани присуство инсектицида и других штетних материја за пчелу и плод малине.

Приликом овог третирања обавезно заштитити и младе изданке који се припремају за род наредне године. Прскање обавити у касним поподневним сатима и у препорученој фенофази развоја.

#### НАПОМЕНА:

ТОКОМ ПЕРИОДА ЦВЕТАЊА, А КАСНИЈЕ И БЕРБЕ ПЛОДОВА У ЗАСАДИМА МАЛИНЕ СЕ НЕ СМЕЈУ КОРИСТИТИ ИНСЕКТИЦИДИ НИ АКАРИЦИДИ ! УПОЗОРАВАЈУ СЕ ПРОИЗВОЂАЧИ ДА СЕ ПРИ ПРИМЕНИ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА У ЗАШТИТИ МАЛИНЕ ПРИДРЖАВАЈУ ДАТИХ УПУСТАВА У ПОГЛЕДУ ИЗБОРА, ВРЕМЕНА ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ И КАРЕНЦЕ У ЗАСАДИМА МАЛИНЕ.

**ПРОИЗВОЂАЧИ, ПРИДРЖАВАЈТЕ СЕ ДАТИХ ПРЕПОРУКА ДА БИ СТЕ ПОСТИГЛИ ДОБАР КВАЛИТЕТ И ОМОГУЋИЛИ ДА МАЛИНА И ДАЉЕ ОСТАНЕ ГЛАВНИ ИЗВОЗНИ ПРОИЗВОД !**