



# POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126  
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

## ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ УСЕВА КРОМПИРА ДО ПОЛОВИНЕ ЈУЛА

### **ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:**

#### **1. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЛАМЕЊАЧЕ КРОМПИРА (*Ph. infestans*)**

Усеви кромпира су у фази цветања и склапања редова. У овој фази развоја кромпира је карактеристично слабије проветравање између редова. Значајне осцилације између дневних и ноћних температура утичу на формирање росе и њено дуже задржавање на лишћу. Овакви услови повећавају ризик од појаве и ширења пламењаче кромпира (*Ph. infestans*). Због јаког сунчевог зрачења често долази до појаве ожеготина на лишћу. За заштиту се препоручују следећи фунгициди:

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| - CUPROXAT                        | у дози 2,0 л/ха      |
| - FUNGURAN                        | у дози 2,0 кг/ха     |
| - CUPROZIN 35WP                   | у дози 2,75 кг/ха    |
| - ANTRACOL                        | у дози 1,8-2,0 кг/ха |
| - DAKOFLO                         | у дози 3,0 л/ха      |
| - MANKOGAL-80                     | у дози 2,5 кг/ха     |
| - DITHANE M- 70                   | у дози 2,5-3,0 кг/ха |
| - RIDOMIL GOLD MZ 68 WP           | у дози 2,5 кг/ха     |
| - FUZIJA                          | у дози 2,5 л/ха      |
| - CURZATE M WG (или CURZATE R WG) | у дози 3,0 кг/ха     |
| - EQUATION PRO WG                 | у дози 0,4 кг/ха     |
| - CONSENTO                        | у дози 1,8-2,0 кг/ха |
| - REVUS 250 SC                    | у дози 0,5-0,6 л/ха  |

Применом препоручених фунгицида постиже се и заштита од антракнозе – црне пегавости ( проузроковач *Alternaria solani* и *Alternaria alternata*). Ако је у усеву кромпира дошло до појаве пламењаче, потребно је применити системичне фунгициде као што су Ridomil gold, Curzate, Equation pro или Fuzija, а заштиту поновити у наредних седам дана.

#### **2. КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ (*L. decemlineata*)**

Заштита се може обавити неким од препоручених средстава:

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - MOSPILAN (ili TONUS ili AFINEX) | у дози 250 гр/ха   |
| - АСТАРА                          | у дози 70 гр/ха    |
| - CONFIDOR 200 SL                 | у дози 300 мл/ха   |
| - CALYPSO 480 SC                  | у дози 100 мл/ха   |
| - CORAGEN                         | у дози 50-60 мл/ха |

Препоручени инсектициди се могу применити када се из јаја на наличју листа излегло 30-40% ларви, при чему су најосетљивије младе ларве Л1 и Л2.

**НАПОМЕНА:** У случају временских непогода праћених градом и оштећењима биљака кромпира, потребна је што хитнија заштита таквих биљака коришћењем превасходно неког од бакарних средстава , јер је оштећена биљка много подложнија нападу пламењаче и других обољења.

УЖИЦЕ 21.07.2017.