



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ

ЗАШТИТУ ЗАСАДА МАЛИНЕ ПРЕД ПОЧЕТАК ЦВЕТАЊА

У фази потпуно развијених цветних пупољака (као на слици)

Прскање засада малине извршити непосредно пред цветање. За то се препоручује комбинација средстава за сузбијање болести и штеточина, које угрожавају засад у то време.



1. За сузбијање болести изданака (пре свих *Didymella applanata* и *Leptosphaeria coniothyrium*), препоручује се употреба једног од следећих средстава:

-SIGNUM	у конц.0,15%(150 ml у 100 l воде)
-QUADRIS (или PROMESA или QUEEN)	у конц.0,075%(75 g у 100 l воде)
-ACORD	у конц.0,075%(75 g у 100 l воде)
-LINUS	у конц.0,15%(150 ml у 100 l воде)
-CAPTAN (или METHOD или MERPAN)	у конц.0,25%(250 g у 100 l воде)

Применом фунгицида Signum или Linus постиже се заштита од Дидимеле и сиве трулежи.

2. За сузбијање штетних инсеката, пре свега малинине бубе, цветоједа, лисних вашију и малинине муве препоручује се употреба једног од инсектицида:

-KARATE ZEON	у конц.0,03%(30ml у 100l воде)
-KOZAK	у конц.0,03%(30 ml у 100 l воде)
-TALSTAR (или FOBOS)	у конц.0,05% (50 ml у 100 l воде)

3. За сузбијање штетних гриња (*Tetranychus urticae*, *Phyllocoptes gracilis*, *Eriophyes essigi*), ако је њихова бројност преко „прага штетности“ што би се неповољно одразило на развој родних гранчица, принос и квалитет, препоручује се употреба једног од акарицида:

- ENVIDOR 240 SC	у конц.0,06% (60 ml у 100 l воде)
- ABASTATE	у конц.0,10% (100 ml у 100 l воде)
- ORTUS	у конц.0,10% (100 ml у 100 l воде)

При овом прскању могу се комбиновати и средства за фолијарну прихрану која садрже калцијум.Редослед мешања је:вода,фолијарно ђубриво+WP+WG+SC или ЕС.

Ово прскање се не сме изоставити а мора се извести пре отварања првих цветова јер се касније не смеју користити инсектициди, како због остатака пестицида на плоду, тако и због тровања пчела. Пре прскања обавезно покосити корове који су цветали!

У овом периоду потребно је поставити клопке за масовно изловљавање азијске воћне мушице (*Drosophyla suzukii*).

На провидним пластичним флашама направити отвор у горњем делу, у њих сипати 1,5 dl црног вина, 1,5 dl јабуковог сирћета и неколико капи детерџента за судове. Посуде окачити на горњу жицу у засаду малине. На рубним зонама клопке распоредити на размаку од 3 м, а унутар засада на размаку од 5 метара.

УЖИЦЕ 27.04.2018.