



**ПОЉОПРИВРЕДНА
САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА
КРАЉЕВО Д.О.О.**

36000 КРАЉЕВО, ЗЕЛЕНА ГОРА БР.29
ТЕЛ/ФАХ: 036/315-053, 036/315-054
Е-ПОШТА: pssibar@sbb.rs

ДУВАНОВ ТРИПС - Thrips tabaci -

Напада:

- ✓ Изразит је полифаг, напада велики број биљака: дукан, памук, лук, празилук, купус, краставац, парадајз, салату, пасуљ, пшеницу, јечам, кукуруз, украсно биље (кане, мушкатле, гладиоле и др.) и разно коровско биље.

опис:

- ✓ То је ситан инсект вретенастог тела, нешто краћи од 1mm. Боје је сламастожуте, покривен тамним длочицама.
- ✓ Крила су уска, прљаво жуте боје и обрубљена танким ресицама, са два нерва на предњим и једним нервом на задњим крилима.
- ✓ Јаја су беличасте боје, прозирна и бубрежастог су облика.

Биологија и екологија:

- ✓ У стакларама развој овог инсекта тече целе године.
- ✓ Целокупан развој на вишим температурама може да заврши за 10 дана. Због тога се бројност повећава у веома кратком временском периоду.
- ✓ Презимљива одрастао инсект у земљишту.

Штете причињавају:

- ✓ Штету чине одрасли инсекти и ларве.
- ✓ На отвореном
- ✓ У заштићеном простору (стакленици, пластеници).
- ✓ На гајеним биљкама штету могу да причине:
 - директно: штету причињавају исисавајући сокове на листовима, цветовима и плодовима биљака.
 - индиректно: као преносилац вируса тачкасте бронзавости парадајза.

Заштита:

Здравствена хигијена је битна за заштиту од трипса, и она се огледа, у одстрањивању биљних остатака, да не би дошло до преживљавања јединки. Правовремена употреба хемијских препарата је битна за успешну заштиту, неким од инсектицида, на бази:

- ✓ Malationa: - DASTICID PRAH, ETIOL PRAH – 5, у дози од 20-30 kg/ha ,
 - ETIOL TEČNI, у дози од 1,5-2,5 l/ha ,
- ✓ Metomila: - LANNATE 25-WP, у дози од 1-1,5 kg/ha
 - LANNATE-90, у концентрацији 0,03-0,05 %,
- ✓ Imidakloprida: - CONFIDOR 200-SL, KONINOR 200-SL, MACHO 200-SL, у дози од 0,5-0,6 l/ha

