

SUZBIJANJE KOROVA POSLE SETVE, PRE NICANJA KUKURUZA

- ▶ Za suzbijanje semenskih uskolisnih(muhar, semenski sirak,svračica,proso) i nekih širokolisnih korova(pepeljuga,štir) može se primeniti neki od sledećih herbicida:
- ▶ **DUAL GOLD -1,4-1,5 l/ha**
- ▶ **ACETOSAV ,ACENIT,ACETOMARK, TROPHY, GENIUS
ACETOHLOR ACETOGAL, - 2 l/ha**

Zbog proširenja spektra delovanja na druge široklisne korove treba dodati preparate na bazi terbutilazina:

- ▶ **TERBIS , REZON,HEMAZIN-1,5-2 l/ha** deluju na koniku, pomoćnicu, gorušicu,mišjakinju

Preparati koji se koriste posle setve a pre nicanja koji se mogu upotrebiti i posle nicanja kukuruza

- ▶ **MERLIN 750 WG** u količini od 135 g/ha deluju na semenski sirak, muhare,lipicu,čičak,tatulu
- ▶ **MERLIN DUO -1,5-2l/ha** i do 3-4 lista
- ▶ **MERLIN FLEX-0,4 l/ha i do 3-4 lista**
- ▶ **CALLISTO** -posle setve ,a pre nicanja useva-0,25-0,30 l/ha suzbija jednogodišnje širokolisne korove i višegodišnje **-palamidu**
- ▶ **Lumax** - 3,5-4l/ha(korovsko proso,sirak iz semena,sivi muhar, lipica, štir, pepeljuga, tatula,pomoćnice,boca,lubeničarka,gorušica)može i u ranom postu (nicanje kukuruza i korova)

Ako u trenutku setve kukuruza ima dosta izniklih korova,preporuka je da se u takvu njivu useje kukuruz a da se posle setve uz ove preparate koji se primenjuju posle setve a pre nicanja kukuruza doda i preparat na bazi glifosata u količini 4l/h da bi se uništio nikli korov.Preparati na bazi glifosata nemaju zemljišno delovanje i neće štetiti nicanju kukuruza.

**Savetodavac za zaštitu bilja
PSSS Jagodina
dipl.ing.Ljiljana Jeremić**

