

ЗАШТИТА БИЉА

БИЛТЕН 6 (Тираж 300 примерака) **14.06.2011.**

Због високих температура у овом периоду, а заштита усева је интензивна, потребно је знати следеће:

Третирање вршити строго на **температурама нижим од 25^оС**, увече, или ујутру после падања росе .

Ако се деси да је пала киша после примене, требамо знати да је за већину пестицидних препарата довољно да **не падне киша 1-2 сата** после примене да би остварили пуно дејство.

ПОВРТАРСТВО: Сузбијање ПЛАМЕЊАЧЕ ПАПРИКЕ, ПАРАДАЈЗА КРАСТАВАЦА И КРОМПИРА

Ради заштите усева **паприке, парадајза и кромпира** од **ПЛАМЕЊАЧЕ**, применити један од следећих препарата: **RIDOMIL MZ GOLD 68 WG** 2,5 кг/ха (а.м. металаксил + манкоцеб), **QUADRIS 0.75** л/ха (азоксистробин), **EQUATION PRO WG** 0,4 кг/ха (а.м. фамоксадон + цимоксанил), **FOLIO GOLD** 2,5-3,0 кг/ха (а.м. МЕТАЛАХИЛ-М + хлорталонил) и.т.д.

По појави првих колонија, извршити третман сузбијања лисних вашију у

ПОВРТАРСКИМ УСЕВИМА једним од следећих препарата: **CHESS 50 WG** 0,4-0,6 кг/ха (а.м. пиметрозин), **MOSPILAN** 0,25 кг/ха (а.м. ацетамиприд), **ACTARA** 0,12-0,15-л/ха (а.м. тиаметоксам), **CONFIDOR 200-SL** 0,6 л/ха (а.м. имидаклоприд).

Сузбијање **КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ** (*L.decemlineata*)

Пошто је у овом периоду дошло до пилења ларви, применити један од следећих препарата: **CONFIDOR 200-SL** 0,2-0,3 л/ха (а.м. имидаклоприд), или **MOSPILAN** 0,25 кг/ха (а.м. ацетамиприд), или **ACTARA** 0,6-0,8-златица (а.м. тиаметоксам), или **CHESS 50 WG** 0,4-0,6 кг/ха (а.м. пиметрозин), итд.

ЈАБУКА - Фенофаза (интензиван пораст плодова)

Проузроковачи биљних болести: *Venturia inequalis*. Имајући у виду да је јабука у фази интензивног пораста плодова, младара, формирања лисне масе, као и да још увек постоји могућност инфекција након киша, за препоруку је третирање јабуке у заштити од чађаве краставости.. Препарати који се могу користити **FOLPAN 50 WP, 0,20%** (а.м., *фолнет*); **КАРТАН 48-SC, MERPAN 48 FS, MERPAN 50-WP** (а.м., *каптан*, и сви наведени препарати у концентрацији примене од 0,3%). У циљу заштите јабуке од *Podosphaera leucotrixa* уколико се одредимо за Clarinet, додати један од препарата на бази *сумпора* (**COSAVET 80 DF, KOLOSUL, KOSSAN WG, KUMULUS DF, KVAŠLJIVI SUMPOR, THIUVIT JET WG, WEBESAN, SUMPOR SC**, концентрација примене за све наведене препарате је 0,5 %).

У циљу сузбијања црвеног паука (по појави покретних форми) за препоруку је одабрати један од инсектицида **ABASTATE, ARMADA, VERMETIC 018 EC, 0,75л/ха** (а.м., *абамектрин*)

Služba za zaštitu bilja