


ВОЂАРИ
ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ “МОРАВИЦА” УЖИЦЕ
ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАШТИТУ ЈАБУКЕ И КРУШКЕ

ЈАБУКУ ПРСКАТИ У ФЕНОФАЗИ РАЗВОЈА »РОЗЕ ПУПОЉАК« (као на слици)



КРУШКУ ПРСКАТИ У ФЕНОФАЗИ РАЗВОЈА »БЕЛИ БАЛОНИ« (као на слици)
ПРСКАЊЕ СЕ ОБАВЉА У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ЧАЂАВЕ КРАСТАВОСТИ (*Venturia sp.*)
ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОВОГ ПАРЗИТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ
ФУНГИЦИДА:

- САРТАН.....у конц. 0,25 % (250 гр у 100 л воде)
- FUNGURAN.....у конц. 0,20 % (200 гр у 100 л воде)
- СУПРОХАТ.....у конц. 0,40 % (400 мл у 100 л воде)
- МАНКОГАЛ.....у конц. 0,25 % (250 гр у 100 л воде)
- СНОРУС 75 WG.....у конц. 0,02 % (20 гр у 100 л воде)

**2. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД
СЛЕДЕЋИХ ИНСЕКТИЦИДА:**

- МЕГАТРИН.....у конц. 0,02% (20 мл у 100 л воде)
- ДЕЦИС.....у конц. 0,06%(60 гр у 100 л воде)
- СРКОРД.....у конц. 0,05%(50 мл у 100 л воде)
- ТАЛСТАР.....у конц. 0,06%(60 гр у 100 л воде)

3. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЕПЕЛНИЦЕ ЈАБУКЕ (*Podosphaera leucotricha*)

НАРОЧИТО СУ ОСЕТЉИВЕ СОРТЕ ЈАБУКЕ **АЈДАРЕД, ЈОНАТАН И ГРЕНИ СМИТ**. КОД ОВИХ СОРАТА
УСЛЕД РАЗВОЈА ОВОГ ПАРЗИТА МОЖЕ ДОЋИ ДО ПОЈАВЕ МРЕЖАВОСТИ ПЛОДОВА, ШТО ИМ УМАЊУЈЕ
ТРЖИШНУ ВРЕДНОСТ.

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ПЕПЕЛНИЦЕ У ОВОЈ ФАЗИ РАЗВОЈА ЈАБУКЕ ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ
ОРГАНСКИХ ФУНГИЦИДА:

- КАРАТАН.....у конц. 0,075% (75 гр у 100 л воде)
- ТОРАС.....у конц. 0,04% (40 мл у 100 л воде)

НАПОМЕНА: - У засадима где је током прошле вегетације било појаве бактериозне пламењаче (*E. amylovora*), препоручује се у овој фази примена бакарних средстава као што су Супрохат или Funguran у горе препорученим концентрацијама, а током цветања применити Супрохат или Funguran у концентрацији 0,05 %. Могуће је мешање наведених препарата са локалсистемчним фунгицидима као што су Chorus или Stroyu. Третирање обавити почетком цветања и у пуном цветању.