

**ПРОИЗВОЂАЧИ КРОМПИРА**  
**ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА**  
**ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ УЖИЦЕ**  
**ОБЈАВЉУЈЕ**

**ЗАШТИТУ УСЕВА КРОМПИРА ТОКОМ ПРВЕ ДЕКАДЕ ЈУНА**

**ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:**

**1. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЛАМЕЊАЧЕ КРОМПИРА (Ph. infestans)**

Временске прилике које карактерише честа смена кишовитог и сунчаног периода током истог дана и изгледима времена у наредном периоду су погодни за развој гљиве (Ph. infestans) узрочника пламењаче кромпира. Услови за појаву пламењаче су нарочито погодни у усевима кромпира који су у фази склапања редова. Због тога је потребно да се изврши превентивна заштита у усевима кромпира.

Прскање се може извршити са једним од препоручених препарата:

- БАКАРНИ ОКСИХЛОРИД           у дози 5,0 кг/ха
- БАКАРНИ КРЕЋ 50 WP           у дози 5,0 кг/ха
- СИНЕВ S 65                   у дози 3,0-4,0 кг/ха
- ДИТАН М 70                   у дози 2,5-3,0 кг/ха
- РИДОМИЛ ГОЛД МЗ 68 WP   у дози 3,0 кг/ха
- КУАДРИС                      у дози 0,750 л/ха
- КУРЗАТЕ М WG               у дози 3,0 кг/ха
- ЕКВАЦИОН ПРО WG           у дози 0.4 кг/ха
- КОНСЕНТО                   у дози 1,8-2,0 кг/ха

**2. КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ (L. decemlineata)**

Кромпирову златицу треба сузбијати када се из јаја на наличју листа излегло преко 50 % ларви. (Учестала појава "Л-3" - старијих ларви).

Прскање се може обавити са неким од препоручених средстава:

- АКТАРА                       у дози 70 гр/ха
- КОНФИДОР 200 SL           у дози 300 мл/ха
- КОНФИДОР 70 WG           у дози 100 гр/ха
- МОСПИЛАН                   у дози 250 гр/ха
- ТОНУС                       у дози 250 гр/ха
- КАЛЫПСО 480 SC           у дози 100 мл/ха

Заштиту обавити под већим притиском, јер се тада боље истретира и лице и наличје листа, па је ефекат заштите далеко већи.

**НАПОМЕНА:**    **На теренима који су захваћени градом и оштећењима биљака кромпира, препоручује се што хитнија заштита таквих биљака коришћењем превасходно неког од бакарних средстава, јер је оштећена биљка много подложнија нападу пламењаче.**