

**ПРОИЗВОЂАЧИ МАЛИНЕ**  
**ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА**  
**ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ УЖИЦЕ**  
**ОБЈАВЉУЈЕ**

**ЗАШТИТУ МЛАДИХ ИЗДАНАКА МАЛИНЕ У ТОКУ СЕПТЕМБРА**  
**МЕСЕЦА**

Према упуствима о радовима у засадима малине после завршене бербе произвођачи су требали већ да обаве резидбу старих изданака малине и заштиту младих препорученим средствима.

Током прве декаде септембра очекују се повремене кишне падавина и наставак повољних услова за развој и појаву болести и напад штеточина.

1. За сузбијање болести изданака (*Didimella applanata*; *Leptosphaeria coniothirium*) укључујући и бактеријска обољења препоручује се употреба једног од бакарних средстава:

CUPRA BLAU Z.....	0,35 % (35 g /10 l vode )
BAKARNI OKSIHLORID 50.....	0,50 % (50 g/10 l vode )
FUNGURAN -OH.....	0,20 % (20 g/10 l vode )
CUPROXAT.....	0,35 % (35ml /10 l vode )
CUPROZIN 35 WP.....	0,35 % (35ml /10 l vode )

2. За сузбијање штетних инсеката, пре свега малинине мушице (*Thomasiniana theobaldi*), може се користити један од инсектицида :

CIPKORD 20 EC.....	0,05 % (5ml/10l vode)
DECIS 2.5-EC .....	0,05 % (5ml/10l vode)
MEGATHRIN 2.5 EC.....	0,02- 0,05 % (2-5ml/10l vode)

Малинина мушица је још активна Њена штетност на младим изданцима настаје полагањем јаја и исхраном ларви. На тај начин долази до механичких оштећења на којима се касније развијају гљивична обољења (*Didimella applanata*, *Leptosphaeria coniothirium*).

С' обзиром на временске прилике које се очекују у наредном периоду два прскања после завршене бербе плодова су довољна за квалитетну заштиту током јесени.

Ове препоручене мере је неопходно извести ради очувања здравственог стања, самим тим и потенцијала родности за следећу годину.