



POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513 754 fax: 031/513 491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПСС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЗАСАДА МАЛИНЕ ПРЕД ПОЧЕТАК ЦВЕТАЊА У фази потпуно развијених цветних пупољака (као на слици)

Прскање засада малине извршити непосредно пред цветање. За то се препоручује комбинација средстава за сузбијање болести и штеточина, које угрожавају засад у то време.



1. За сузбијање болести изданака (пре свих *Didimella applanata* и *Leptosphaeria coniothirium*), препоручује се употреба једног од следећих средстава:

- QUADRIS u konc.0,075% (75 gr u 100 l vode)
- SIGNUM u konc.0,15 % (150 ml u 100 l vode)

2. За превентивно сузбијање узročника трулежи плодова (*Botrytis cinerea*) препоручује се употреба једног од следећих средстава:

- SWITCH u konc.0,08 % (80 gr. u 100 l vode)
- TELDOR u konc.0,15 % (150 gr. u 100 l vode)
- DIONAL u konc.0,20 % (200 ml u 100 l vode)
- SIGNUM u konc.0,15 % (150 ml u 100 l vode)

3. За сузбијање штетних инсеката, пре свега малинине бубе, цветоједа, лисних вашију и малинине муве препоручује се употреба једног од инсектицида:

- NURELL -D u konc.0,10% (100 ml u 100 l vode)
- KONZUL u konc.0,10% (100 ml u 100 l vode)
- TALSTAR u konc.0,06% (60 ml u 100 l vode)

4. За сузбијање штетних гриња (*Tetranychus urticae*, *Phyllocoptes gracilis*, *Eriophies essigi*), ако је њихова бројност преко „прага штетности“ што би се неповољно одразило на развој родних гранчица, принос и квалитет, препоручује се употреба једног од акарицида:

- DEMITAN 200 SC u konc.0,06% (60 ml u 100 l vode)
- ORTUS 5 SC u konc.0,10% (100 ml u 100 l vode)
- ABASTATE u konc.0,075% (75 ml u 100 l vode)

Ово прскање се не сме изоставити, јер се касније улази у фенофазу цветања, када се не смеју користити инсектициди, како због остатака пестицида на плоду, тако и због тровања пчела!

Заштитом у овом периоду се сузбијају штеточине и болести које могу да умање принос малине. При овом прскању могу се комбиновати и средства за фолијарну прихрану која садрже калцијум.

Редослед мешања средстава је: вода, фолијарно ђубриво + WP + WG + SC или EC