

ПРОИЗВОЂАЧИ КРОМПИРА
ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ УЖИЦЕ
ОБЈАВЉУЈЕ

ЗАШТИТУ УСЕВА КРОМПИРА У ПОСЛЕДЊОЈ ДЕКАДИ ЈУНА

ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЛАМЕЊАЧЕ КРОМПИРА (*Ph. infestans*)

Према подацима са аутоматских метеоролошких станица временски услови у претходној недељи су били са високим ризиком од појаве пламењаче кромпира (*Ph. infestans*). Обзиром на количину падавина која је пала и очекивани раст температуре у наредном периоду, биће висок ризик и од појаве неких других гљивичних и бактеријских обољења кромпира. Заштита се може извршити са једним од препоручених препарата:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - CUPROXAT | у дози 2,0 л/ха |
| - BAKARNI OKSILORID-50 | у дози 5,0 кг/ха |
| - FUNGURAN | у дози 2,0 кг/ха |
| - MANKOGAL-80 | у дози 2,5 кг/ха |
| - DITAN M 70 | у дози 2,5-3,0 кг/ха |
| - RIDOMIL GOLD MZ 68 WP | у дози 3,0 кг/ха |
| - QUADRIS | у дози 0,750 л/ха |
| - CURZATE M WG | у дози 3,0 кг/ха |
| - EQUATION PRO WG | у дози 0,4 кг/ха |
| - CONSENTO | у дози 1,8-2,0 кг/ха |
| - TATOO | у дози 4,0 л/ха |

У периоду док кромпир интензивно расте, па док не склопи редове препоручује се коришћење системичних средстава, која пружају заштиту и новом порасту који израсте после прскања. У условима честих и обилних падавина, период између третирања треба смањити са 12-15 дана (у нормалним условима), на 7 до 10 дана.

Применом препоручених фунгицида постиже се и заштита од антракнозе – црне пегавости (проузроковач *Alternaria solani* и *Alternaria alternata*) која се учестало јавља у претходном периоду.

2. КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ (*L. decemlineata*)

Кромпирову златицу треба сузбијати када се из јаја на наличју листа излегло преко 50 % ларви. (Учестала појава "Л-3" - старијих ларви). Прскање се може обавити са неким од препоручених средстава:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| - REGENT | у дози 25-30 гр/ха |
| - AKTARA | у дози 70 гр/ха |
| - CONFIDOR 200 SL | у дози 300 мл/ха |
| - MOSPILAN | у дози 250 гр/ха |
| - NURELLE-D | у дози 900 мл/ха |
| - CALYPSO 480 SC | у дози 100 мл/ха |

НАПОМЕНА: У случају временских непогода праћених градом и оштећењима биљака кромпира, потребна је што хитнија заштита таквих биљака коришћењем превасходно неког од бакарних средстава, јер је оштећена биљка много подложнија нападу пламењаче.