



POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513 754 fax: 031/513 491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПСС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ УСЕВА КРОМПИРА У ДРУГОЈ ДЕКАДИ ЈУЛА

ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЛАМЕЊАЧЕ КРОМПИРА (*Ph. infestans*)

Обилне падавине које су пале крајем јуна и почетком јула, су испрале постојећу заштиту, па је неопходно поновити прскање против узрочника болести и штетних инсеката. Услови за развој пламењаче су повољни, са високим ризиком ширења и настанка секундарних инфекција. Препорука фунгицида је прилагођена истовременом сузбијању и узрочника пламењаче (*Ph. infestans*) и црне пегавости (*Alternaria sp.*), које се већ јављају на терену. Прскање се може извршити са једним од препоручених препарата:

- БАКАРНИ ОКСИХЛОРИД 50 у дози 5,0 кг/ха
- FUNGURAN у дози 2,0 кг/ха
- ANTRACOL у дози 2,0 кг/ха
- DITHAN NEO TEC у дози 2,5 кг/ха
- RIDOMIL GOLD MZ 68 WP у дози 3,0 кг/ха
- FUZIJA у дози 2,5 л/ха
- CURZATE M WG у дози 3,0 кг/ха
- ACROBAT MZ-WP у дози 2,5 кг/ха
- CONSENTO у дози 1,8-2,0 кг/ха
- TATOO у дози 4,0 л/ха

Препоручује се коришћење системичних средстава, која пружају заштиту и новом порасту који израсте после прскања. У случају да дође до појаве пламењаче у усеву, потребно је хитно извршити заштиту са неким од системичних фунгицида (Consento, Tadoo, Ridomil gold.). Прскање поновити са истим средством после пет дана.

2. КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ (*L. decemlineata*)

Ако до сада није обављено сузбијање кромпирове златице или то није учињено адекватно, за ову намену се може користити неко од препоручених средстава:

- REGENT у дози 25-30 гр/ха
- АКТАРА у дози 70 гр/ха
- CONFIDOR 200 SL у дози 300 мл/ха
- MOSPILAN у дози 250 гр/ха
- TONUS у дози 250 гр/ха
- CALYPSO 480 SC у дози 100 мл/ха

НАПОМЕНА: У случају временских непогода праћених градом и оштећењима биљака кромпира, препоручује се што хитнија заштита таквих биљака коришћењем превасходно неког од бакарних средстава у комбинацији са системичним (Ridomil, Curzate, Fuzija i sl.) јер је оштећена биљка много подложнија нападу пламењаче.

УЖИЦЕ 13.07.2010.