



POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513 754 fax: 031/513 491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПСС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ

ЗАШТИТУ ВОЋАКА ОД ГЛОДАРА ТОКОМ ЗИМЕ

Почетком зиме и касније због недостатка других извора хране глодари могу нанети веће штете, нарочито у младим засадима воћа и засадима малине и купине. Од штетних глодара најзаступљеније су волухарице (*Microtus arvalis*, *Arvicola terrestris*) као и пољски и шумски миш (*Apodemus agrarius*, *Apodemus flavicollis*, *Apodemus sylvaticus*). Они се хране на корену воћака, па га тако оштећују, а са друге стране у случају велике бројности популације праве густ систем ходника и рупа у земљи. Повећање бројности ових глодара подстиче ђубрење стајњаком у јесењем периоду који се оставља на површини земљишта, као и јака закоровљеност засада током јесени.

Када је у питању дивљач, штете могу да причине зец и срна због недостатка других извора хране у овом периоду. Дивљи зец (*Lepus europeus*) може да направи огромну штету у воћним засадима глођући кору. Највеће штете које овом приликом могу настати је оштећење у зони кореновог врата испод окалемљеног места, или прстенасто оштећење коре, при чему долази до прекида спроводног ткива и обавезног сушења. Потенцијално су најугроженији воћни засади у близини шума, али превентивно је потребно обавити заштиту и свих других засада.

За сузбијање волухарица и мишева препоручује се прво провера активних рупа, па примена родентицидних мамаца као што су :

CINKFOSFID МАМАК

FOSFIROD

SURADIOLON ZRNA

BRODILON МАМАК

GALIBROM

у дози од 5 до 10 г мамка по активној рупи, после чега се отвори загрђу земљом и затварају.

За одбијање дивљачи – Зеца препоручује се примена веома ефикасног средства, које има улогу репелента који одбија зеца од третираних стабала спречавајући да дође до штете. За ову намену препоручује се:

KUNILENT R-17 у концентрацији 5 - 10 % (0,5 л до 1 л на 10 л воде)

Третирање се изводи премазивањем стабала и рамених грана, јер некад због високог снега зец може да допре и до виших делова стабла. На тај начин заштита је обезбеђена за период од 50 дана (0,5 л на 10 л воде) односно 80 дана (1 л на 10 л воде) После истека овог периода третирање треба поновити, јер штете које могу настати су много веће од вредности овог третирања.

УЖИЦЕ 15.11.2010.