



ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПСС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ПРСКАЊЕ ВОЋА У ФАЗИ БУБРЕЊА И ПУЦАЊА ПУПОЉАКА

1.ПРСКАЊЕ ЈАБУЧАСТОГ ВОЋА (јабука, крушка, дуња, мушмула)

– Обавити у фази развоја пупољка као на слици

Ово прскање се обавља у циљу смањења инфективног потенцијала гљивичних и бактеријских обољења која презимљавају на гранама воћака, а нарочито *Erwinia amilovora* узročника бактеријске пламењаче јабучастог воћа. Овом заштитом су обухваћене и презимљујуће форме штетних инсеката и гриња које такође презимљавају на гранама воћака. Прскање обавити после резидбе једним од следећих средстава:



- **GALMIN**..... 2,0 – 3,0 % (2,0 do 3,0 kg u 100 l vode)
- **BELO ULJE**..... 2,0 – 3,0 % (2,0 do 3,0 kg u 100 l vode)

Горе наведени препарати ради проширења дејства и на узročнике болести, се могу комбиновати са препаратом **CUPRABLAU Z Ultra 0,35 %** или **CUPROXAT 0,4%(0,4 kg u 100 l vode)** или **BAKARNI OKSIHLORID 50 0,6 % (0,6 kg u 100 l vode)**.

У овом периоду се могу применити и готове мешавине минералног уља и бакарних фунгицида, које се користе самостално:

- **PLAVO ULJE**.....2-3 % (2,0 do 3,0 l u 100 l vode)
- **CRVENO ULJE**.....1-1,5 % (1,0 do 1,5 kg u 100 l vode)

2.ПРСКАЊЕ КОШТИЧАВОГ ВОЋА (шљива, бресква, трешња, вишња, кајсија)

Обавити у фази развоја пупољка као на слици

Сва средства која су наведена за јабучасто воће, могу се применити и за коштичаво воће, након обављене резидбе, а у фази бубрења и пуцања пупољака (почетак вегетације). Овим третирањем спречава се ширење заразе гљивом *Taphrina cerasi* узročника појаве тзв. „вештичијих метли“ на гранама шљиве, уз обавезу претходног уклањања оболелих грана. За заштиту брескве од коврцавости листа (гљива *Taphrina deformans*) ово прскање се обавља у фази појаве зелене тачке на врху пупољка. Наредно третирање брескве се обавља након 5-7 дана препаратом **Dakoflo 0,2%** или **Delan 700WG 0,07%** или **Sillit 400SC 0,25%**.



3. ПРСКАЊЕ МАЛИНЕ И КУПИНЕ(обавити у фази као на слици)

- **GALMIN 2,0 % (2,0 kg u 100 l vode) + BAKARNI OKSIHLORID 50 0,5 % (0,5 kg u 100 l vode)** ili
- **BELO ULJE 2,0 % (2,0 kg u 100 l vode) + CUPROXAT 0,40 % (0,4 kg u 100 l vode)** ili
- **PLAVO ULJE 2-3 % (2,0 do 3,0 l u 100 l vode)- примењује се самостално**
- **CRVENO ULJE 1,0 do 1,5 % (1,0 do 1,5 l u 100 l vode)- примењује се самостално**



Напомена: Рано пролећно прскање обавити по сувом и тихом времену. Потребно је извршити купање биљака већом количином течности, третирањем одозго на доле. Смањити притисак на прскалицу и користити заштитну опрему. Температура ваздуха при прскању треба да је преко 7 °С, а пожељно је да не буде падавина у наредна 3-4 сата по обављеном прскању.