



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЗАСАДА ШЉИВЕ

1. ПОЧЕТКОМ ЦВЕТАЊА (као на слици)



У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА УЗРОЧНИКА СУШЕЊА ЦВЕТОВА И ГРАНЧИЦА И ТРУЛЕЖИ ПЛОДОВА КОШТИЧАВОГ ВОЋА (*Monilia laxa*)

На ову болест су посебно осетљиве сорте шљиве Стенлеј и Чачанска родна.

За заштиту од овог паразита препоручује се једно од следећих средстава:

- CHORUS 75-WG.....0,02 % (20 ml u 100 l vode)
- KUBIK PLUS.....0,25 % (250 ml u 100 l vode)
- AKORD.....0,075% (75 ml u 100 l vode)
- SIGNUM0,075% (75 g u 100 l vode)

Наведена средства су фунгициди са локалсистемичним или системичним својствима, а прскање је потребно извести у касним поподневним сатима по тихом времену.

У периоду цветања је забрањена употреба инсектицида због присуства пчела и др. опрашивача у засаду.

2. У ФАЗИ ПРЕЦВЕТАВАЊА (као на слици)



У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА ШЉИВИНИХ ОСА (*Hoplocampa sp.*), ПЛАМЕЊАЧЕ ШЉИВЕ (*Polystigma rubrum*), РОГАЧА ШЉИВЕ (*Taphrina pruni*)

Сузбијање шљивиних оса треба обавити после пуног цветања (80% цветова прецветало), када пчеле више не посећују цветове.

За заштиту треба применити један од следећих препарата:

- PERFECTION ili DIMETOGAL.....0,15 % (150 ml u 100 l vode)
- KONZUL ili NURELL-D.....0,10 % (100 ml u 100 l vode)
- SIPKORD ili CYTRIN.....0,03 % (30 ml u 100 l vode)

Једном од ових препарата треба додати неки од следећих фунгицида ради заштите од пламењаче и рогача шљиве :

- CAPTAN ili METHOD.....0,30 % (300 g u 100 l vode)
- DITHANE0,25 % (250 g u 100 l vode)
- MANKOGAL.....0,25 % (250 ml u 100 l vode)
- ANTRACOL.....0,20 % (200 g u 10 l vode)

Ово третирање обавити у касним поподневним сатима по тихом времену.

НАПОМЕНА

Ради заштите инсеката опрашивача пре извођења овог прскања обавезна је косидба траве и корова у засаду шљиве који у том тренутку цветају (маслачак, мртва коприва и сл.) Тако се спречава да пчеле и други опрашивачи слећу на исцветали коров на који пада заштитно средство. Пре почетка прскања обавезно прочитати приложено упутство за употребу препарата и истог се придржавати.

УЖИЦЕ 12.04.2013.