



# POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126  
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

## ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЈАБУКЕ И КРУШКЕ У ПРВОЈ ДЕКАДИ ЈУНА

Велика количина падавина у претходном периоду ствара оптималне услове за развој и ширење бактеријских и гљивичних обољења. У оваквим условима због спирања и разградње пестицида од претходне заштите, биљке су скоро потпуно незаштићене. Нарочито је велики ризик од ширења чађаве краставости на плодове и од инфекције узрочницима трулежи плодова јабуке и крушке.

### ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

#### 1. ПРОУЗРОКОВАЧА ЧАЂАВЕ КРАСТАВОСТИ (*Venturia inequalis*, *V. pirina*)

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОВОГ ПАРАЗИТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ФУНГИЦИДА:

- |                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| - ANTRACOL         | у конц. 0,20% (200 gr на 100 l воде)  |
| - DITHANE          | у конц. 0,30% (300 gr на 100 l воде)  |
| - MANKOGAL 80      | у конц. 0,25% (250 gr на 100 l воде)  |
| - DELAN            | у конц. 0,035% (350 gr на 100 l воде) |
| - ACORD            | у конц. 0,03% (30 ml на 100 l воде)   |
| - SCORE            | у конц. 0,02% (20 ml на 100 l воде)   |
| - SYSTANE 12 E     | у конц. 0,035% (35 ml на 100 l воде)  |
| - FOLICUR EM 50 WP | у конц. 0,075% (75 gr на 100 л воде)  |
| - TERCEL           | у конц. 0,20% (200 gr на 100 l воде)  |

2. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ИНСЕКТИЦИДА:

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| - MOSPILAN (или TONUS или AFINEX) | у конц. 0,025% (25 gr на 100 l воде) |
| - TALSTAR (или FOBOS)             | у конц. 0,06% (60 gr на 100 l воде)  |
| - CORAGEN 20 SC                   | у конц. 0,02% (20 ml на 100 l воде)  |
| - CIPKORD                         | у конц. 0,03% (30 ml на 100 l воде)  |
| - KONZUL (или NURELL –D)          | у конц. 0,10% (100 ml на 100 l воде) |

Због ефикаснијег сузбијања штетних инсеката и правилног коришћења инсектицида потребно је користити неко друго препоручено средство у односу на претходно коришћено.

3. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ГРИЊА (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus* sp.) НА ЈАБУЦИ И КРУШЦИ ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ АКАРИЦИДА:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| - NISSORUN                 | у конц. 0,05% (50 ml на 100 l воде)                  |
| - DEMITAN                  | у конц. 0,06% (60 ml на 100 l воде)                  |
| - ENVIDOR + Mineralno ulje | у конц. 0,060% + 0,25% (60 ml+ 250 ml на 100 l воде) |

**НАПОМЕНА:** У случају временских непогода праћених градом и оштећењима биљака, потребно је што пре поновити прскање, без обзира на време извођења претходног третирања. У засадима где је дошло до појаве бактериозне пламењаче (*E. amylovora*), препоручује се уклањање оболелих грана и до 50 cm испод видљиво зараженог дела гране. Обавезна је дезинфекција маказа у варикини или алкохолу. Одмах након тога се препоручује примена фунгицида на бази бакар хидроксида као што су Funguran, Kocide200 или Fungohem у концентрацији 0,05%. На тај начин се спречава ширење болести наредним падавинама.

УЖИЦЕ 03.06.2013.