



ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЗАСАДА МАЛИНЕ ПРЕД ПОЧЕТАК ЦВЕТАЊА

У фази потпуно развијених цветних пупољака (као на слици)

Прскање засада малине извршити непосредно пред цветање. За то се препоручује комбинација средстава за сузбијање болести и штеточина, које угрожавају засад у то време.



1. За сузбијање болести изданака (пре свих *Didymella applanata* и *Leptosphaeria coniothyrium*), препоручује се употреба једног од следећих средстава:

-SIGNUM u konc.0,15% (150 ml u 100 l vode)

-QUADRIS (ili PROMESA, AZAKA ili QUEEN) u konc.0,075% (75 gr u 100 l vode)

-ACORD u konc.0,075% (75 gr u 100 l vode)

2. За превентивно сузбијање узрочника трулежи плодова (*Botrytis cinerea*) препоручује се употреба једног од следећих средстава:

- SWITCH u konc.0,08 % (80 gr. u 100 l vode)

- TELDOR u konc.0,15 % (150 gr. u 100 l vode)

- MYTHOS (ili PEHAR ili PYRUS 0,2%) u konc. 0,25% (250 ml u 100 l vode)

Применом фунгицида Signum постиже се заштита од Дидимеле и сиве трулежи. Ако се примењује Quadris потребно му је додати фунгицид против сиве трулежи.

3. За сузбијање штетних инсеката, пре свега малинине бубе, цветоједа, лисних вашију и малинине муве препоручује се употреба једног од инсектицида:

-NURELL D (ili KONZUL ili ANTHOCID-D) u konc.0,10% (100ml u 100l vode)

-TALSTAR (ili FOBOS) u konc.0,06% (60 ml u 100 l vode)

4. За сузбијање штетних гриња (*Tetranychus urticae*, *Phyllocoptes gracilis*, *Eriophies essigi*), ако је њихова бројност преко „прага штетности“ што би се неповољно одразило на развој родних гранчица, принос и квалитет, препоручује се употреба једног од акарицида:

- ENVIDOR 240 SC u konc.0,06% (60 ml u 100 l vode)

- SANMITE 20 WP u konc.0,06% (60 ml u 100 l vode)

- ABASTATE u konc.0,075% (75 ml u 100 l vode)

При овом прскању могу се комбиновати и средства за фолијарну прихрану која садрже калцијум. Редослед мешања средстава је: вода, фолијарно ђубриво + WP + WG + SC или EC

Ово прскање се не сме изоставити а мора се извести пре отварања првих цветова јер се касније не смеју користити инсектициди, како због остатака пестицида на плоду, тако и због тровања пчела. Пре прскања обавезно покосити корове који су цветали!