



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЗАШТИТУ ЈАБУКЕ И КРУШКЕ ДО ПОЛОВИНЕ ЈУНА

Велика количина падавина у претходном периоду ствара оптималне услове за развој и ширење бактеријских и гљивичних обољења. У оваквим условима због спирања и разградње пестицида од претходне заштите, биљке су скоро потпуно незаштићене. Нарочито је велики ризик од ширења чађаве краставости на плодове и од инфекције узрочницима трулежи плодова јабуке и крушке.

ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:

1. ПРОУЗРОКОВАЧА ЧАЂАВЕ КРАСТАВОСТИ (*Venturia inequalis*, *V. pirina*)

ЗА СУЗБИЈАЊЕ ОВОГ ПАРАЗИТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ФУНГИЦИДА:

- ANTRACOL u konc. 0,20% (200 gr na 100 l vode)
- DITHANE u konc. 0,30% (300 gr na 100 l vode)
- MANKOGAL 80 u konc. 0,25% (250 gr na 100 l vode)
- DELAN u konc. 0,035% (350 gr na 100 l vode)
- ACORD u konc. 0,03% (30 ml na 100 l vode)
- SCORE u konc. 0,02% (20 ml na 100 l vode)
- SYSTANE 12 E u konc. 0,035% (35 ml na 100 l vode)
- FOLICUR EM 50 WP u konc. 0,075% (75 gr na 100 l vode)
- TERCEL u konc. 0,20% (200 gr na 100 l vode)

2. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ ИНСЕКТИЦИДА:

- MOSPILAN (ili TONUS ili AFINEX) u konc. 0,025% (25 gr na 100 l vode)
- TALSTAR (ili FOBOS) u konc. 0,06% (60 gr na 100 l vode)
- CORAGEN 20 SC u konc. 0,02% (20 ml na 100 l vode)
- RUNNER u konc. 0,06% (60 ml na 100 l vode)
- CIPKORD u konc. 0,03% (30 ml na 100 l vode)
- KONZUL (ili NURELL –D) u konc. 0,10% (100 ml na 100 l vode)

Због ефикаснијег сузбијања штетних инсеката и правилног коришћења инсектицида потребно је користити неко друго препоручено средство у односу на претходно коришћено.

3. ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШТЕТНИХ ГРИЊА (*Panonychus ulmi*, *Tetranychus* sp.) НА ЈАБУЦИ И КРУШЦИ ПРЕПОРУЧУЈЕМО ЈЕДАН ОД СЛЕДЕЋИХ АКАРИЦИДА:

- NISSORUN u konc. 0,05% (50 ml na 100 l vode)
- DEMITAN u konc. 0,06% (60 ml na 100 l vode)
- ENVIDOR + Mineralno ulje u konc. 0,060% + 0,25% (60 ml+ 250 ml na 100 l vode)

НАПОМЕНА: У случају временских непогода праћених градом и оштећењима биљака, потребно је што пре поновити прскање, без обзира на време извођења претходног третирања. У засадима где је дошло до појаве бактериозне пламењаче (*E. amylovora*), препоручује се уклањање оболелих грана и до 50 cm испод видљиво зараженог дела гране. Обавезна је дезинфекција маказа у варикини или алкохолу. Одмах након тога се препоручује примена фунгицида на бази бакар хидроксида као што су Funguran, Kocide200 или Fungohem у концентрацији 0,05%. На тај начин се спречава ширење болести наредним падавинама.

УЖИЦЕ 07.06.2016.