



*POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I
STRUČNA SLUŽBA „UŽICE“ DOO*

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126
tel: 031/513-754, 031/513-491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ

СУЗБИЈАЊЕ УЗРОЧНИКА ТРУЛЕЖИ ПЛОДОВА ЈАБУКЕ

ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА ТРИ
НАЈЗНАЧАЈНИЈА ТИПА ТРУЛЕЖИ

1. МРКА ТРУЛЕЖ ПЛОДОВА ЈАБУКЕ, чији је узрочник *Monilia fructigena*
2. ГОРКА ТРУЛЕЖ ПЛОДОВА чији је узрочник *Glomerella cingulata* и *Gloeosporium* sp.
3. ПЛАВА ТРУЛЕЖ ПЛОДОВА чији је узрочник *Penicilium expansum*

Ови паразити настајују плодове током вегетације и у фази зрења. Касније, током складиштења настављају да се развијају на убраним плодовима узрокујући труљење већих размера. На тај начин плодови губе тржишну вредност, а трулеж се шири и на друге плодове у складишту. Ово захтева чешће пребирање плодова и повећање трошкова чувања.

За заштиту јабуке током зрења препоручује се један од следећих фунгицида:

- ZATO	u konc. 0,015%	(15 gr na 100 l vode)
- GALOFUNGIN	u konc. 0,06%	(60 ml na 100 l vode)
- SWITCH	u konc. 0,08%	(80 gr na 100 l vode)
- BELLIS	u konc. 0,08%	(80 gr na 100 l vode)
- FUNOMIL	u konc. 0,07%	(70 gr na 100 l vode)
- GEOXE	u konc. 0,45%	(45 gr na 100 l vode)

Ово третирање се обавља у фази технолошке зрелости плодова и то оптимално на 15 дана пре почетка бербе. Примена фунгицида Bellis или Switch се препоручује 7 дана пре почетка бербе плодова.

На овај начин уз обавезно чишћење и дезинфекцију складишта пре бербе, спречава се појава труљења и продужава период чувања плодова.

УЖИЦЕ 18.09.2017.