

“Poljoprivredna Stručna Služba Šabac“doo
Šabac, Vojvode Putnika 26
Telefon: 015/301-820
E mail.psssabac@gromnet.net
Datum: 15.09.09.

OBAVEŠTENJE:

Suzbijanje glodara

Prilikom hemijskog suzbijanja glodara veoma je važno i vreme tretiranja. Suzbijanje

poljske vaoluharice je u toku leta i jeseni, a poljski miševi se suzbijaju po potrebi :

-ako se primeti 10-50 aktivnih rupa po ha u voćnjaku , ili 500 aktivnih rupa u ratarstvu treba izvršiti hemijsko tretiranje.

-prebrojavanje se vrši tako što se dan pre postavljanja mamaka sve rupe zatrpaju drljačom

-sutradan aktivne rupe će biti ponovo otvorene i u njih treba postaviti mamke pa zatrpati zemljom

-na površini zemljišta se ne smeju ostavljati mamci, jer su otrovni za ptice i divljači

-ne smeju se postavljati golom rukom, već pogodnim metalnim ili drvenim predmetima (kašika ili čašica)

Za suzbijanje glodara u polju mogu se koristiti sledeći preparati:

- CINKFOSFID MAMAK U KOLIČINI 5-10 gr/AKTIV.RUPI

-ANTIKOLIN MAMAK U KOLIČINI 10-15 gr/AKTIV.RUPI

-BROMADIOLON MAMAK U KOLIČINI 15-20 gr/AKTIV.RUPI

Po završetku akcije suzbijanja ,ostatke mamaka i uginule glodare treba pokupiti, spaliti ili zakopati vodeći računa o vodozaštitnim zonama!!!

VAŽNO: Cinkfosfid prah i Galibrom prah mogu primenjivati za spravljanje mamaka samo organizacije koje u pogledu kadrova, opreme i uređaja ispunjavaju uslove za rad sa otrovima iz prve grupe

Zaštita od divljači- sadnica voćaka i šumskog drveća, i mladih zasada voćaka može biti :

-mehanička (postavljanje mrežica ili omotavanje stabala papirnatim džakovima)

-hemijska-Kunilent R-17(a.m. sulfonovano riblje ulje+neutralne drvene smole) koristi se kao repelent za srne i zečeve za zaštitu sadnica voćaka i šumskog drveća, i mladih zasada voćaka u konc. 5-10%, pri čemu se obezbeđuje zaštita od 50-80 dana.

Dipl.ing. Jasmina Jocković