

PEPELNICA LESKE(Phyllactinia guttata)

Pepelnica leske je gljivično oboljenje prilično zastupljeno i lako prepoznatljivo. Javlja se kao bela, brašnasta, pepeljasta prevlaka na naličju lista i omotaču ploda. Dolazi do kovrdžanja i opadanje listova. Obično se javlja krajem leta a u slučaju velikih infekcija pepeljaste prevlake se javljaju i na licu lista.

Patogen prezimljava u formi okruglih, zatvorenih plodonosnih tela unutar kojih se nalaze ascospore. Ascospore ostaju prikačene na listovima i pupoljcima pomoću lepljivih supstanci i tu prezimljava. Zrela plodonosna tela pucaju i otvaraju se po sredini oslobađajući spore po listovima pupoljcima i izdancima. Iz obolelih delova se stvaraju lanci belih konidija i oni se kružno šire. Kad su dovoljno namnožene vidi se bela skrama na listovima. Lako se prenose vetrom.

Preventivno se može delovati rezidbom kako bi bilo dovoljno provetravanje.

Hemiske mere borbe se primenjuju na početku zaraze sa pojavom prvih simptoma. Ako je prethodne godine bilo infekcije potrebno je rano tretiranje fungicidima sistemcima. Fungicid registrovan za pepelnicu je sumpor. Obavezno je pridržavanje upotrebe navedeno na ambalaži.

Evica Radonjić, dipl. agronom

PSSS Kuršumlja