

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE



BILTEN



POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA NOVI PAZAR D.O.O.

BILTEN BROJ 155 - ČETVRTI KVARTAL 2025 - BESPLATAN PRIMERAK

STRANA 4

JESENJI RADOVI U PLASTENIKU



ISHRANA KRAVA U TOKU ZIME / ČESTA PITANJA NAŠIH POLJOPRIVREDNIKA



STRANA 6

ZAŠTITA JABUKA U SKLADIŠTIMA



STRANA 2

ŠARKA ŠLJIVE

STRANA 3

PODSTICAJ
ZA NABAVKU
PRIPLODNIH GRILA

STRANA 4

ISHRANA KOKOŠI


STRANA 5

ČUVANJE VOĆA
U OBIČNIM
SKLADIŠTIMA

STRANA 7

PREGLED
CENA SA PIJACE

STRANA 8



MASTER POLOPRIVREDE BELKISA RABIĆ

ZAŠTITA JABUKA U SKLADIŠTIMA

Veći broj vrsta gljiva prisutan je na plodovima jabuke u voćnjaku u trenutku berbe, odakle zajedno s plodovima dospevaju u skladište.

Skladište i prostor na ulazu skladišta treba da bude detaljno očišćen od svih trulih ostataka plodova koji mogu da budu značajan izvor zaraze jer na njima patogen preživljava neuporedivo duže nego na inernim površinama. Berbu obaviti tako da među plodovima nema trulih, nagnječenih ili na drugi način oštećenih, a ubrane plodove što pre skloniti sa sunca i dopremiti do skladišta; Transportna sredstva treba da su čista, bez ostataka trulog voća. Zbog mogućnosti dospevanja spora na plodove tokom njihovog transporta u skladište, potrebno ih je pokriti nekim laganim čistim materijalom.

Fungicidi koji se koriste za suzbijanje skladišnih bolesti mogu se koristiti 7 do 14 dana pre berbe, poput preparata na bazi aktivne materije trifloksistrobin (karenca 14 dana), ciprodinil + fludioksonil (3 dana), fludioksinil (3 dana), boskalid + piraklostrobin (7 dana).


Najznačajnije bolesti jabuke koje se razvijaju nakon berbe i tokom skladištenja su prouzrokovane gljivama: *Monilinia fructigena*, *Colletotrichum gleosporoides*, *Penicillium* spp, *Botrytis* spp.

Smeđa (mrka) trulež plodova (*Monilinia fructigena*), se razvija kako u voćnjacima, tako i u skladištima, Prilikom berbe jabuke može se desiti da plodovi naizgled nemaju infekciju, ali se simptomi uočavaju sa dozrevanjem u skladištu i naročito po izlasku na tržište iz uslova hlađenja. Prvi simptomi su male, površinske, braon pege koje brzo počinju sa truljenjem. U vlažnim uslovima se brzo razvijaju konidije. Siva trulež, koju prouzrokuje gljiva *Botrytis cinerea* je u početku suva i čvrsta, ali kako napreduje postaje mekana. U vlažnim uslovima gljiva obrazuje veliki broj sivih spora, dok u krajnjem stadijumu može obrazovati i sklerocije. Prezimljava sklerocijama u zemljištu i biljnim ostacima. *Botrytis cinerea* je saprofit, pa se često može naći na trulim biljnim ostacima u voćnjaku, što je



glavni izvor infekcije u polju. Infekcija može nastati i u polju i u skladištu.

Gorka trulež plodova (*Colletotrichum gleosporoides*). Gljiva prezimljava u kori drveta i mumificiranim plodovima zaraženim prethodne godine. Formira toksine koji zaraženom plodu daju gorak ukus, po čemu je i dobila ime. Simptomi se razvijaju u voćnjaku na plodovima u uslovima visoke vlažnosti tokom leta i jeseni. Bolest se širi i u hladnjači, a naročito se naglo javljaju simptomi pri iznošenju iz hladnjače na tržište.





DIPL.ING. SVETLANA ŠUĆEVIĆ

ŠARKA ŠLJIVE

Virus šarke šljive prouzrokuje virus Plum pox potyvirus (PPV). Šarka šljive je najpoznatija i najopasnija virusna bolest šljiva koja izaziva ogromne ekonomske štete. Virus zaražava sve delove biljke uz pojavu karakterističnih simptoma na listovima, cvetovima, plodovima i košticama. To je neizlečiva virusna bolest jer jednom zaraženo stablo ostaje čitavog života zaraženo i nema mogućnost izlječenja. Pojava simptoma zavisi od spoljašnjih uslova kao što su temperatura, način i intenzitet gajenja voća. Oni variraju u zavisnosti od vrste i sorte, starosti biljke, soja virusa i često se mogu zapaziti samo na nekim delovima biljaka. Listovi se prepoznaju po posvetljenim nervima u vidu

mozaičkog šarenila lociranog između nerava lista, zaostalim porastom, kovrdžavim oblikom. Javlja se i pege prstenastog oblika sa hlorotičnim oreolom i zelenim unutrašnjim delom. Ove pege su karakteristične za šarku, dok je broj pega na listu različit. Zaraženi plodovi su deformisani, manjih dimenzija lakši od zdravih, sa svetlim pegama i prstenovima, neukusni, neprijatne arome i žilavi. Plodovi ranije sazrevaju i opadaju i time gube tr-

žišnu i upotrebnu vrednost. Naj osetljivija sorta je požegača, manje osetljive su stenlej i čačanske sorte (čačanska rana, čačanska lepotica i čačanska rodna). Virus se širi sadnim materijalom, vegetativnim razmnožavanjem zaraženih biljaka-kalemljenjem i insektima, prvenstveno lisnim vašima. Prenosjenje na veće udaljenost iobavlja se preko zaraženog sadnog materijala (podloga i kalem pupoljaka uzetih sa bolesnih matičnih biljaka). Lisne vaši su odgovorne za širenje virusa na manjoj udaljenosti u oblastima koje su već zaražene i gde se nalaze žarišta infekcije. Kako se biljni virusi ne mogu suzbiti hemijskim tretmanima, preporučuju se preventivne mere:

1. karantinske mere kontrole unošenja virusa iz zemalja, regiona ili proizvodnih oblasti u kojima je virus prisutan;

2. ozbiljan nadzor nad zdravljem bilja, praćenje prisustva virusa vizuelnim pregledima pojave simptoma i laboratorijskim testiranjem;

3. proizvodnju i korišćenje bez virusnog sadnog materijala;

4. Izbor povoljne lokacije za gajenje koštičavog voća, sa povoljnim agroekološkim uslovima, uz obaveznu prostornu izolaciju;


5. gajenje vrsta koje nisu domaćini virusu šarke šljive – jabučaste voćne vrste,

koje mogu predstavljati zaštitni pojas od vektora i moguće infekcije,

6. suzbijanje vektora virusa šarke šljive (biljne vaši);

7. gajenje otpornih ili tolerantnih sorti;

8. uništavanje zaraženih stabala kako bi se sprečilo dalje širenje.





MASTER AGROEKONOMISTA IVANA MAJDAK

PODSTICAJI ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRILA

Podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grila imaju za cilj unapređenje genetskog potencijala, konkurentnost i stabilnost stočarske proizvodnje. Subvencije za nabavku kvalitetnih priplodnih grila obezbeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Uprave za agrarna plaćanja a javni pozivi se objavljuju periodično. Podsticaji se odnose na nabavku kvalitetnih priplodnih grila goveda, ovaca i koza, grla svinja i pčelinjih matica. Uzrast grla u momentu izdavanja računa mora biti sledeći:

- junica tovnih rasa od 8-34 meseci, junica mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 12-31 mesec, bikova tovnih rasa uzrasta od 10-30 meseci i bikova mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 36-72 meseca.

- ovaca-dviski uzrasta od 6-18 meseci, koza-dviski od 6-18 meseci i dvisci uzrasta od 6-18 meseci.

- nazimica uzrasta od 9 meseci, suprasnih nazimica osemenjenih najkasnije do 9 meseci i nerastova uzrasta do 12 meseci.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, imaju upisan odgovarajući stočni fond, kao i da su izvršila obnovu registracije za tekuću godinu i nalaze se u aktivnom status. Uz elektronski obrazac zahteva, prilaže se u elektronskoj formi:

1. Račun za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice

2. Otpremnica za nabavku kvalitetnog priplodnog grla-pčelinje matice

3. Dokaz o izvršenom plaćanju (kopija potvrde o prenosu sredstava ili izvoda, overenih od strane banke, fiskalni isečak)

4. Kopija jedinstvene carinske isprave-podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz

5. Kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja, overen od strane nadležnog veterinarskog inspektora

6. Kopija pedigrea ili uverenja o poreklu, za životinju koja je predmet zahteva.

Digitalizaciju prethodno navedenih dokumenata može izvršiti poljoprivredni savetodavac, poljoprivredni i veterinarski inspektor, odgajivačka organizacija i organ jedinice lokalne samouprave.



MASTER POLJOPRIVREDE SMAIL EJUPOVIĆ

JESENJI RADOVI U PLASTENIKU

Jesen je vreme kada u plasteniku vegetativnu sezonu završavaju ljetnje kulture te bez obzira da li planiramo neku zimsku proizvodnju ili ne, moramo pristupiti određenim radovima. Uzimajući u obzir da su plastenici u blizini kuća te da su po 10-15 i više godina na istom mestu kao i to da se plodored primenjuje u većoj ili manjoj meri, onda ti radovi moraju biti detaljni naročito sa aspekta zaštite od prenošenja biljnih bolesti i štetočina. Stoga najpre ćemo pristupiti generalnom čišćenju tako što ćemo prikupiti sve vezove i plastične kanape zatim oštećene i polutrule biljne ostatke; vreže, stabla i korenje te sve to obavezno odstraniti daleko od plastenika i



DIPL.ING. STOČARSTVA ZUMRETA TRTOVAC

ISHRANA KOKOŠI

Ishrana kokoši se razlikuje od ishrane drugih vrsta domaćih životinja. Dužina organa za varenje kod živine je mala, pa se hrana kratko zadržava u organizmu. To znači da se obrok mora sastojati od lako i brzo svarljivih hraniva sa malim sadržajem celuloze. Obrok treba da bude tako sastavljen

uništiti jer su oni najčešći prenosioci raznih bolesti i štetočina. Što se tiče održavanja konstrukcije i folija, njih treba oprati i očistiti od prašine, buđi, algi, mahovine i eventualne korozije. Nakon toga treba pristupiti kontroli i održavanju sistema za navodnjavanje, proveriti pumpu, filtere, ventile, glavnu i razvodne cevi i ako negde ima curenja to sanirati. Dezinfekciju cevi možemo odraditi tako što ćemo propustiti namensko sredstvo kroz cevi koje tu treba zadržati 2-3 sata a nakon toga ispustiti i oprati. Zbog nepoštovanja plodoreda i same životne sredine u plasteniku imamo situaciju da se razni patogeni i štetni organizmi tu razvijaju i zadržavaju. Stoga je potrebno obaviti dezinfekciju zemljišta i to hemijski ili skidanjem i zamenom gornjeg sloja u visini od 10-15 cm. Uzimajući u obzir da je proizvodnja u plastenicima veoma intenzivna izraženo je veliko iznošenje hranive materije pa je dodavanje organskog đubriva obavezno jer iscrpljeno zemljište gubi propustnost, menja strukturu, smanjuje vodno vazdušni kapacitet i zbog svega toga, osim organskog potrebno je unošenje i mineralnih đubriva prema planiranoj kulturi i kontroli plodnosti zemljišta.

da pored dovoljne količine hranljivih sastojaka za potrebe održavanja funkcije organizma (uzdržni obrok), sadrži i hranljive sastojke za proizvodnju jaja i mesa (proizvodni obrok). Veličina uzdržnog obroka zavisi od starosti i težine živine, a proizvodnog od intenziteta nosivosti i prirasta. Izboru hraniva se mora pokloniti naročita pažnja, moraju biti kvalitetna i lako svarljiva.

Od energetske hraniva, žita se koriste kao osnova u smešama u količini 60-70%. Najčešće se upotrebljava kukuruz, koji ima visoku energetske vrednost. Pšenica se dodaje smešama u količini 10-30%, a ječam povoljno deluje kod brojlera na kvalitet mesa. Mekinje mogu učestvovati u smešama za nosilje do 20%, a kod pilića 5%. Ovas i raž treba izbegavati. Ovas zbog visokog sadržaja celuloze, a raž zbog lošeg ukusa.

Od proteinske hraniva biljnog porekla, soja je najkvalitetnije i najvrednije hranivo. U obliku sačme koristi se do 30% u smešama. Suncokretova sačma može delimično da zameni sojinu, ukoliko ima manje ljsaka. Od proteinske hraniva životinjskog porekla najviše se koristi riblje brašno. Pored ovih hraniva koriste se: obrano mleko u prahu, surutka, stočni kvasac.

Od mineralnih hraniva najčešće se koriste stočna kreda i koštano brašno. Potreba za vitaminima podmiruju se vitaminskim koncentratima (premix) i dehidriranom zelenom hranom. Ne sme se zaboraviti da živina ima velike potrebe u vodi. Dnevne potrebe za vodom su 2-3 puta veće od količine uzete hrane.

Ishrana kokoši nosilja: zavisi od njihove težine i nosivosti, težine snešenih jaja i visine spoljašnje temperature. Malo je seoskih gazdinstava koja koriste smeše koncentrata za ishranu nosilja. Kokoši se uglavnom uzgajaju slobodno, u dvorištu, gde se hrane kukuruzom ili nekom drugom žitaricom. U intenzivnom načinu gajenja, nosilje proizvedu 200-250 jaja godišnje, pa se u ishrani moraju koristiti koncentrata.





DIPLOM. ING. STOČARSTVA SAFET VESNIĆ

ISHRANA KRAVA U TOKU ZIME

U zimskom period kod ishrane krava, osnovno kabasto hranivo je silaža od kompletne kukuruzne biljke. Lucerkino seno često služi kao dopuna kabastoj hrani. Njegova količina u velikoj meri zavisi od vremenskih prilika, koje mogu biti presudne za obezbeđivanje većih količina sena.

Odgovarajuća proizvodnja mleka u zimskom period ostvaruje se ukoliko je u kabastoj



hrani odnos silaže i sena 50-50 %. U tom slučaju obezbeđena je hranljiva vrednost i dobar ukus hrane.

Nije uvek lako obezbediti kvalitetnu silažu od kompletne kukuruzne biljke. U godinama kada su nepovoljne vremenske prilike, komplikovanja je i proizvodnja kvalitetne silaže. Suša u određenim fazama razvoja kukuruza dovodi do toga da bude manje klipova u odnosu na ukupnu masu biljke.

Vlasnici grla su u tom slučaju prinuđeni da ne poštuju faz uvoštanog zrenja zrna kukuruza, što je inače optimum prilikom siliranja. Naime, struka i nauka insistiraju da se siliranje kompletne kukuruzne biljke obavlja u stadijumu voštanog zrenja.

U fazi mlečnog zrenja biljka sadrži manje šećera, a više skroba i daje suviše kiselu silažu, koju stoka nerado jede, pogotovo ako se silira pre mlečnog zrenja.

Optimalni stadijum zrenja kukuruza za siliranje je kada odnos klipa i stabljike iznosi 50:50 %. Ako process siliranja teče normalno, pH vrednost silaže dostiže 3,7-4,2. Odnos ispoljenih kiselina takođe ukazuje na njen kvalitet. Mlečna kiselina je bez mirisa. Oštar miris svedoči o prisustvu veće količine sirćetne kiseline. Neugodan, kiselkast miris je znak viška buterne kiseline. Dobra silaža sadrži oko 2 % mlečne i 0,3-0,5 % sirćetne kiseline sa tragovima buterne kiseline.

Uostalom, glavni preduslov za uspešnu proizvodnju je dobar zdravstveni status farme i dobro zdravlje svakog grla.

ČESTA PITANJA NAŠIH POLJOPRIVREDNIKA

Da li postoji mogućnost da zahtev za odobravanje podsticaja podnese bez prikupljene tražene dokumentacije, na primer originalnog sertifikata?

U slučajevima kada odgovarajuća dokumentacija nije poslata ili kada poslata dokumentacija sadrži određene nedostatke, podnosiocu zahteva upućuje se poziv za ispravku podneska, kojom se podnosilac zahteva obaveštava da dostavi dokumentaciju koja nedostaje ili sadrži određene nedostatke, kako bi ostvario pravo na podsticaj na sredstva. Ukoliko se u procesu administrativne obrade zahteva ustanovi određeni nedostatak u pogledu dokumentacije, korisnik će biti obavešten, upućivanjem poziva za ispravku podneska na adresu prijavljenu u registru poljoprivrednih gazdinstava.

Koja je razlika između ugovora koji se zaključuje sa Upravom za agrarna plaćanja i samog rešenja koje dostavlja Uprava za agrarna plaćanja?

1) U slučaju kada je uredbom predviđeno da korisnici sredstava sa Upravom za agrarna plaćanja zaključuju ugovor, tada se na svapitanja o pravima,



DIPL.ING. SILVIA HODŽIĆ

ČUVANJE VOĆA U OBIČNIM SKLADIŠTIMA

Voće u svežem stanju može se čuvati u običnim skladištima kao što su odgovarajući podrumi, trapovi, adaptirani magacini i slični magacinski prostori.

Neretko se ukazuje potreba privremenog

obavezama i odgovornostima ugovornih strana primenjuje zakon o obligacionim odnosima. Eventualne sporove rešavaće stvarno ili mesno nadležni Sud.

2) Ako u samom pravilniku nije predviđeno zaključivanje ugovora, kao način za regulisanje međusobnih prava i obaveza, Uprava za agrarna plaćanja kao državni ogran, pri vođenju postupka i odlučivanju po zahtevima za korišćenje podsticajnih sredstava, postupa po odredbama Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 95/2018). U tom smilu, o ostvarivanju prava na podsticaje, odlučuje director Uprave za agrarna plaćanja rešenjem. Korisnik podsticaja koji nije namenski koristio sredstva kao i korisnik podsticaja koji je sredstva primio na osnovu netačno prikazanih podataka dužan je da vrat iznos dobijenih sredstava uvećan za iznos zatezne kamate, najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja direktora Uprave za agrarna plaćanja – član 18. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“ broj 41/2009, 10/2013 . dr. zakoni i 11/2016).

MASTER POLJOPRIVREDE STEFAN PAJOVIĆ

čuvanja plodova jabuke i kruške preko zime. Plodove je potrebno pripremiti, kako bi se što bolje očuvali. Oni moraju biti zdravi i na vreme ubrani. Treba ih pojedinačno umotati u polumasni papi-rić, običnu salvetu ili tanki papir. Umotani plodovi slažu se u čistu ambalažu, a za to mogu poslužiti gajbe, sanduci i korpe. Na sanducima ako je po-trebno napraviti rupe za ventilaciju. Ovako raspo-ređeni plodovi slažu se u razna skladišta. Potrebno je da stalaže budu drvene. Temperatura treba da se održava na oko 5°C, relativna vlažnost vazduha 70-80% uz odgovarajuću ventilaciju.

Ukoliko se primeti smežuravanje vršnih plo-dova, pod treba kvasiti vodom ili se voda drži u više plićih, širokih posuda. Za slučaj pojave plesni na zidovima treba okrečiti ili premazati odgovara-jućim sredstvima. Ovako se čuvaju plodovi tri do šest meseci.

Umotani plodovi mogu da se ređaju i na pod u podrumu, na sloj slame debljine oko 20cm, u vidu trapezoidnog oblika (osnova da bude oko 2m, visina 1,5m, pri vrhu širina 1m, a dužina pre-ma uslovima). Proizvodi, materijali i hrana koja širi strani miris ne smeju se držati u podrumu.

Plodovi jabuke se mogu čuvati i u polietilen-skim vrećama težine do 5kg plodova. Vrećice tre-ba zavezati i izbušiti na nekoliko mesta. Vrećice se čuvaju složene u sanduke ili korpe u podrumima. Ako se vrećice slažu u slojevima s peskom, pa se čuvaju u voćnjaku zaštićene zemljom ili u podru-mu, mogu se sačuvati i preko šest meseci.

Ovako pripremljeni plodovi čuvaju se i u trapovima. Prvo se napravi plato od nabijene ze-mlje. Plato može biti i popločan. Na taj plato se slo-ži sloj slame debljine oko 15cm. Plodovi se zatim ređaju po toj slami (širine oko 2m u osnovi, a 1m pri vrhu). Preko plodova složi se slama oko 15cm debljine, a preko nje sloj vlažne zemlje oko 25cm debljine utabane sa strane. Odozgo, preko zemlje može se staviti polietilenska folija. U vidu dimnjaka po dužini se stavljaju ventilatori. Oko trapova se kopaju odgovarajući kanali za odvod vode.



PREGLED CENA SA ZELENE, KVANTAŠKE I STOČNE PIJACE NA DAN 10.11.2025. GODINE

POVRĆE			VOĆE			PIJAČNA CENA STOKE	
PROIZVOD	KVANTAŠ DIN/KG	ZELENA DIN/KG	PROIZVOD	KVANTAŠ DIN/KG	ZELENA DIN/KG	PROIZVOD	ŽIVA VAGA DIN/KG
KRASTAVAC	130	150	BANANA	200	220	TELAD ŽENSKA	680
ŠARGAREPA	40	50	LEŠNIK	1000	1200	TELAD MUŠKA	760
PARADAJZ	170	200	KRUŠKA	170	200	JUNAD DO 300 KG	490
BELI LUK	800	1000	LIMUN	200	220	JUNAD DO 480 KG	470
KUPUS	40	70	JABUKA	100	120	KRAVE ZA KLANJE	350
KROMPIR	80	100	ORAH	1000	1200	JAGNJAD	410
TIKVICE	150	200	GROŽĐE	200	250	DVISKE	350
CRNI LUK	50	70	MANDARINA	120	150	OVCE	290
PLAVI PATLIDŽAN	200	250	POMORANDŽE	180	200	OVNOVI	350
PAPRIKA	180	200	DUNJA	180	200	PRASAD DO 25 KG	350

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

IZDAJE: POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA NOVI PAZAR D.O.O.

36300 NOVI PAZAR, UL. 7. JULI BB,

TEL: +381 20 337 800, 337 801, 51 01 547

E-MAIL: pss.novipazar@gmail.com

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: MR NIHAD R. HASANOVIĆ DIPL.ING.

TEHNIČKI UREDNIK: ALBIN ŠABOTIĆ,

TEKSTOVE PRIREDILI:

ZUMRETA TRTOVAC DIPL.ING.

SVETLANA ŠUĆEVIĆ DIPL. ING

SMAIL EJUPOVIĆ MASTER POLJOP.

IVANA MAJDAK MASTER AGROEKONOM.

SAFET VESNIĆ DIPL.ING.

SILVIJA HODŽIĆ DIPL.ING.

STEFAN PAJOVIĆ MASTER POLJOP.

BELKISA RABIĆ MASTER POLJOP.

TIRAZ: 250 PRIMERAKA

- SAVETODAVAC ZA STOČARSTVO
- SAVETODAVAC ZA ZAŠTITU BILJA
- SAVETODAVAC ZA RATARSTVO
- SAVETODAVAC ZA AGROEKONOMIJU
- SAVETODAVAC ZA STOŠARSTVO
- SAVETODAVAC ZA VOČARSTVO
- SAVETODAVAC ZA RURALNI RAZVOJ
- SAVETODAVAC ZA ZAŠTITU BILJA

SVI POLJOPRIVREDNI
PROIZVOĐAČI KOJI IMAJU
VIŠAK PROIZVODA ZA TRŽIŠTE
MOGU KONTAKTIRATI
SVOG POLJOPRIVREDNOG
SAVETODAVCA I OBJAVITI
BESPLATNU PONUDU SVOJIH
PROIZVODA NA SAJTU

AGROPONUDA
BERZA POLJOPRIVREDNIH
PROIZVODA

WWW.AGROPONUDA.COM